

2018학년도 11월 고2 전국연합학력평가 정답 및 해설

• 2교시 수학 영역 •

[나형]

1	3	2	4	3	5	4	3	5	5
6	2	7	4	8	3	9	1	10	4
11	1	12	2	13	3	14	5	15	3
16	1	17	5	18	1	19	2	20	4
21	5	22	8	23	9	24	12	25	7
26	11	27	128	28	2	29	32	30	253

1. [출제의도] 지수법칙을 이용하여 계산하기

$$5^3 \times 5^{-2} = 5^{3-2} = 5^1 = 5$$

2. [출제의도] 미분계수 계산하기

$$f'(x) = 4x^3 \text{ 이므로 } f'(1) = 4$$

3. [출제의도] 등비수열의 극한 이해하기

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{5 \times 4^n}{4^n + 1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{5}{1 + \left(\frac{1}{4}\right)^n} = \frac{5}{1+0} = 5$$

4. [출제의도] 차집합 이해하기

$$A - B = \{3, 4\}$$

따라서 모든 원소의 합은 7

5. [출제의도] 역함수 이해하기

$$f^{-1}(0) = a \text{ 라 하면 } f(a) = 0 \text{ 이므로 } a - 2 = 0$$

따라서 $a = 2$

6. [출제의도] 집합 사이의 포함관계 추론하기

$$\{3, 4, 5\} \cap A = \emptyset \text{ 이므로}$$

집합 A는 집합 {1, 2}의 부분집합이다.

따라서 모든 집합 A의 개수는 $2^2 = 4$

7. [출제의도] 진리집합의 포함관계 추론하기

두 조건 p, q의 진리집합을 각각 P, Q라 하면

$$P = \{\sqrt{a}, -\sqrt{a}\}, Q = \{2\}$$

p가 q이기 위한 필요조건이 되려면 $P \supset Q$ 이어야 하므로 $\sqrt{a} = 2$

따라서 $a = 4$

8. [출제의도] 미분계수 이해하기

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(2+h) - f(2)}{3h} = \frac{1}{3} \times \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(2+h) - f(2)}{h} = \frac{1}{3} \times f'(2) = 5$$

따라서 $f'(2) = 15$

9. [출제의도] 절대부등식 이해하기

$$4x + \frac{a}{x} \geq 2\sqrt{4x \times \frac{a}{x}} = 2\sqrt{4a} = 2$$

(단, 등호는 $4x = \frac{a}{x}$ 일 때 성립한다.)

따라서 $a = \frac{1}{4}$

10. [출제의도] 급수와 일반항의 관계 이해하기

급수 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n - \frac{2n}{3n+1}\right)$ 이 수렴하므로

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(a_n - \frac{2n}{3n+1}\right) = 0 \text{ 이다.}$$

따라서 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \frac{2}{3}$

11. [출제의도] 합성함수 이해하기

$$g(1) = 1 \text{ 이므로 } f(g(1)) = f(1) = 2$$

$$f(3) = 1 \text{ 이므로 } g(f(3)) = g(1) = 1$$

따라서 $(f \circ g)(1) + (g \circ f)(3) = 3$

12. [출제의도] 도함수를 활용하여 문제해결하기

함수 $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + 1$ 에서

$$f'(x) = 3x^2 - 12x + 9 = 3(x-1)(x-3)$$

$$f'(x) = 0 \text{ 에서 } x = 1 \text{ 또는 } x = 3$$

함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	...	1	...	3	...
f'(x)	+	0	-	0	+
f(x)	↗	5	↘	1	↗

$$\therefore \alpha = 1, M = f(1) = 5$$

따라서 $\alpha + M = 6$

13. [출제의도] 유리함수의 그래프 이해하기

$$\text{함수 } f(x) = \frac{3x+1}{x-k} = \frac{3k+1}{x-k} + 3 \text{ 의 그래프의}$$

두 점근선의 방정식은 $x = k, y = 3$ 이고

두 점근선의 교점 $(k, 3)$ 은 직선 $y = x$ 위의 점이다.

따라서 $k = 3$

14. [출제의도] 등차중항 이해하기

등차수열 $\{a_n\}$ 의 공차를 d라 하면

$$a_6 - a_2 = 4d \text{ 이고 } a_4 = a_1 + 3d \text{ 이므로 } a_1 = d \dots \textcircled{1}$$

$$a_1 + a_3 = 2a_2 \text{ 이므로 } a_2 = a_1 + d = 10 \dots \textcircled{2}$$

$$\textcircled{1}, \textcircled{2} \text{ 에 의하여 } a_1 = d = 5$$

$$\therefore a_n = 5 + (n-1) \times 5 = 5n$$

따라서 $a_{10} = 50$

15. [출제의도] 함수의 극한 이해하기

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = 2, \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 0 \text{ 이므로}$$

부등식 $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) > \lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$ 를 만족시키는

a의 값은 0

16. [출제의도] 도함수를 활용하여 문제해결하기

점 P의 시각 t에서의 위치가 $x = -t^2 + 6t$ 이므로

$$\text{속도는 } \frac{dx}{dt} = -2t + 6$$

$$-2t + 6 = 2 \text{ 에서 } t = 2$$

따라서 t=2에서의 점 P의 위치는 8

17. [출제의도] 수열의 합 이해하기

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^m (a_k + 3)^2 &= \sum_{k=1}^m (a_k^2 + 6a_k + 9) \\ &= \sum_{k=1}^m a_k^2 + 6 \sum_{k=1}^m a_k + \sum_{k=1}^m 9 \\ &= 3 - 6 + 9m = 60 \end{aligned}$$

따라서 $m = 7$

18. [출제의도] 로그의 성질 추론하기

자연수 n에 대하여

$$\log_{n+1}(n+2) = \frac{\log_2(n+2)}{\log_2(n+1)} \text{ 이므로}$$

$$\sum_{k=1}^{14} \log_2 \{ \log_{k+1}(k+2) \}$$

$$= \log_2 \left(\frac{\log_2 3}{\log_2 2} \right) + \log_2 \left(\frac{\log_2 4}{\log_2 3} \right) + \dots + \log_2 \left(\frac{\log_2 16}{\log_2 15} \right)$$

$$= \log_2 \left(\frac{\log_2 3}{\log_2 2} \times \frac{\log_2 4}{\log_2 3} \times \dots \times \frac{\log_2 16}{\log_2 15} \right)$$

$$= \log_2 \left(\frac{\log_2 16}{\log_2 2} \right) = \log_2 4 = 2$$

$$\therefore f(n) = \log_2(n+2), p=4, q=2$$

따라서 $f(p+q) = \log_2 8 = 3$

19. [출제의도] 수열의 귀납적 정의 추론하기

$a_{n+1} + a_n = 2n^2$ 에서

$n = 1$ 일 때, $a_2 + a_1 = 2 \times 1^2$ 이므로

$$a_2 = 2 - a_1$$

$n = 2$ 일 때, $a_3 + a_2 = 2 \times 2^2$ 이므로

$$a_3 = 8 - a_2 = 6 + a_1$$

$n = 3$ 일 때, $a_4 + a_3 = 2 \times 3^2$ 이므로

$$a_4 = 18 - a_3 = 12 - a_1$$

$n = 4$ 일 때, $a_5 + a_4 = 2 \times 4^2$ 이므로


$$a_5 = 32 - a_4 = 20 + a_1$$

$a_3 + a_5 = 26 + 2a_1 = 26$ 이므로 $a_1 = 0$

따라서 $a_2 = 2 - a_1 = 2$

20. [출제의도] 등비급수를 활용하여 문제해결하기

그림 R_1 에서



선분 C_1C_2 와 선분 B_1D_1 이 만나는 점을 H라 하자.

$$\overline{B_1D_1} = 2\sqrt{2}$$

$$\overline{HC_2} = \overline{C_1C_2} - \overline{C_1H}$$

$$= 2 - \sqrt{2}$$


이므로

$$S_1 = \frac{1}{2} \times \overline{B_1D_1} \times \overline{HC_2}$$

$$= \frac{1}{2} \times 2\sqrt{2} \times (2 - \sqrt{2})$$

$$= 2\sqrt{2} - 2$$

다음은 그림 R_{n+1} 의 일부이다.



$$\begin{aligned} \overline{AC_{n+1}} &= \overline{AC_n} - \overline{C_{n+1}C_n} \\ &= \overline{AC_n} - \overline{B_nC_n} \\ &= \overline{AC_n} - \frac{\sqrt{2}}{2} \times \overline{AC_n} \\ &= \frac{2 - \sqrt{2}}{2} \overline{AC_n} \end{aligned}$$

이고 $\overline{AC_n} = \overline{B_nD_n}$ 이므로

$$\overline{AC_n} : \overline{AC_{n+1}} = \overline{B_nD_n} : \overline{B_{n+1}D_{n+1}} = 1 : \frac{2 - \sqrt{2}}{2}$$

그러므로 그림 R_n 과 R_{n+1} 에서 새로 얻어진 두 삼각형은 서로 닮음이고

닮음비가 $1 : \frac{2 - \sqrt{2}}{2}$ 이므로

넓이의 비는 $1 : \frac{3 - 2\sqrt{2}}{2}$ 이다.

그러므로 수열 $\{S_n\}$ 은


첫째항이 $2\sqrt{2} - 2$ 이고 공비가 $\frac{3 - 2\sqrt{2}}{2}$ 인

등비수열의 첫째항부터 제 n 항까지의 합이다.

$$\text{따라서 } \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \frac{2\sqrt{2} - 2}{1 - \frac{3 - 2\sqrt{2}}{2}} = \frac{12 - 4\sqrt{2}}{7}$$

21. [출제의도] 함수의 연속 추론하기

ㄱ. 집합 $\{(x, y) \mid y = x \text{ 또는 } y = x^2\}$ 이 나타내는 도형과 직선 $x + y = 0$ 을 좌표평면에 나타내면 그림과 같다.



$x^2 = -x$ 에서 $x = 0$ 또는 $x = -1$
 $\therefore a = 0$ 일 때, $f(0) = 2$ 이다. (참)


ㄴ. $x + y = -\frac{1}{4}$ 과 $y = (x - a)^2 - a$ 를 연립하여

정리하면 $x^2 - (2a - 1)x + a^2 - a + \frac{1}{4} = 0$ 이다.

이 이차방정식의 판별식을 D_1 이라 하면

$$D_1 = (2a - 1)^2 - 4\left(a^2 - a + \frac{1}{4}\right) = 0 \text{ 이므로}$$

직선 $x + y = -\frac{1}{4}$ 과 곡선 $y = (x - a)^2 - a$ 는 한 점에서 만난다.




$$\lim_{t \rightarrow -\frac{1}{4}^-} f(t) = 1, \quad \lim_{t \rightarrow -\frac{1}{4}^+} f(t) = 3 \text{ 이므로}$$

$f(t)$ 는 $t = -\frac{1}{4}$ 에서 불연속이다. (참)


ㄷ.

(i) 곡선 $y = (x - a)^2 - a$ 와 직선 $y = x$ 가
 만나는 점의 개수가 0인 경우



함수 $f(t)$ 의 불연속인 점의 개수가 1이다.

(ii) 곡선 $y = (x - a)^2 - a$ 와 직선 $y = x$ 가
 만나는 점의 개수가 1인 경우



함수 $f(t)$ 의 불연속인 점의 개수가 2이다.

곡선 $y = (x - a)^2 - a$ 와
 직선 $y = x$ 가 접할 때의 a 의 값을 구하자.

$(x - a)^2 - a = x$ 에서 이를 정리하면

$$x^2 - (2a + 1)x + a^2 - a = 0$$

이 이차방정식의 판별식을 D_2 라 하면


$$D_2 = (2a + 1)^2 - 4(a^2 - a) = 8a + 1$$

$$D_2 = 0 \text{ 에서 } a = -\frac{1}{8}$$

(iii) 곡선 $y = (x - a)^2 - a$ 와 직선 $y = x$ 가
 만나는 점의 개수가 2인 경우

(a) 곡선 $y = (x - a)^2 - a$ 가 두 직선

$y = x, y = -x - \frac{1}{4}$ 이 만나는 점을 지나는 경우



함수 $f(t)$ 의 불연속인 점의 개수가 2이다.

곡선 $y = (x - a)^2 - a$ 가

두 직선 $y = x, y = -x - \frac{1}{4}$ 이

만나는 점 $(-\frac{1}{8}, -\frac{1}{8})$ 을 지나므로


$-\frac{1}{8} = (-\frac{1}{8} - a)^2 - a$ 를 정리하면

$$\left(a - \frac{3}{8}\right)^2 = 0$$

$$\therefore a = \frac{3}{8}$$

(b) 곡선 $y = (x - a)^2 - a$ 가 두 직선 $y = x,$

$y = -x - \frac{1}{4}$ 이 만나는 점을 지나지 않는 경우



함수 $f(t)$ 의 불연속인 점의 개수가 3이다.

(i), (ii), (iii)에 의하여

함수 $f(t)$ 가 $t = a$ 에서 불연속이 되는 실수 a 의

개수가 2일 때, a 의 값은 $-\frac{1}{8}, \frac{3}{8}$ 이다.

따라서 모든 a 의 값의 합은 $\frac{1}{4}$ 이다. (참)

따라서 ㄱ, ㄴ, ㄷ

22. [출제의도] 로그 이해하기

$$\log_2 a = 3 \text{ 이므로 } a = 2^3 = 8$$

23. [출제의도] 무리함수의 그래프 이해하기

함수 $y = \sqrt{3x}$ 의 그래프를

x 축의 방향으로 m 만큼 평행이동시키면

$$y = \sqrt{3(x - m)} = \sqrt{3x - 3m}$$

$$3m = 27 \text{ 이므로 } m = 9$$

24. [출제의도] 수열의 극한 이해하기

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(a-2)n^2 + bn}{2n-1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(a-2)n + b}{2 - \frac{1}{n}} = 5$$

이므로 $a=2, b=10$
따라서 $a+b=12$

25. [출제의도] 부정적분 이해하기

$$f'(x) = 4x - 1 \text{ 이므로}$$

$$f(x) = \int (4x - 1) dx = 2x^2 - x + C$$

(단, C 는 적분상수)
 $f(0) = 1$ 이므로 $C = 1$
 $\therefore f(x) = 2x^2 - x + 1$
따라서 $f(2) = 7$

26. [출제의도] 다항함수의 미분 이해하기

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - 3}{x - 1} = 2 \text{ 이고 } \lim_{x \rightarrow 1} (x - 1) = 0 \text{ 이므로}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \{f(x) - 3\} = 0 \text{ 에서 } f(1) = 3$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - 3}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = f'(1) \text{ 이므로}$$

$$f'(1) = 2$$

$$g'(x) = 3x^2 f(x) + x^3 f'(x) \text{ 이므로}$$

$$g'(1) = 3f(1) + f'(1) = 3 \times 3 + 2 = 11$$

27. [출제의도] 등비수열을 활용하여 문제해결하기

등비수열 $\{a_n\}$ 의 공비를 r 라 하면,
조건 (가)에서 $a_1 \times a_2 = a_1^2 r, 2a_3 = 2a_1 r^2$ 이므로
 $a_1^2 r = 2a_1 r^2$
수열 $\{a_n\}$ 의 모든 항이 양수이므로 $a_1 = 2r \dots \textcircled{1}$
조건 (나)에서 $r = 1$ 이면
 $\sum_{k=1}^{20} a_k = 20a_1, \frac{a_{21} - a_1}{3} = 0$ 이므로 $a_1 = 0$
 $a_1 > 0$ 이므로 $r \neq 1$
 $\sum_{k=1}^{20} a_k = \frac{a_1(r^{20} - 1)}{r - 1}, \frac{a_{21} - a_1}{3} = \frac{a_1(r^{20} - 1)}{3}$ 에서
 $\frac{1}{r-1} = \frac{1}{3}$ 이므로 $r = 4$
 $\textcircled{1}$ 에서 $a_1 = 8$
따라서 $a_3 = 8 \times 4^2 = 128$

28. [출제의도] 함수의 극한을 활용하여 문제해결하기

$P(t, \sqrt{4t-3}), Q(0, \sqrt{4t-3})$ 이므로
 $S(t) = \frac{1}{2} \times 1 \times (t-1), T(t) = \frac{1}{2} \times t \times (\sqrt{4t-3} - 1)$
따라서
$$\lim_{t \rightarrow 1^+} \frac{T(t)}{S(t)} = \lim_{t \rightarrow 1^+} \frac{\frac{1}{2} \times t \times (\sqrt{4t-3} - 1)}{\frac{1}{2} \times (t-1)}$$

$$= \lim_{t \rightarrow 1^+} \frac{4t(t-1)}{(t-1)(\sqrt{4t-3} + 1)}$$

$$= 2$$

29. [출제의도] 미분계수 추론하기

$$h'(4) = \lim_{x \rightarrow 4} \frac{f(x)g(x) - f(4)g(4)}{x - 4}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 4} \frac{f(x) \times \frac{1}{x-4} - 2f(4)}{x - 4}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 4} \frac{f(x) - 2(x-4)f(4)}{(x-4)^2} \dots \textcircled{1}$$

에서 $\lim_{x \rightarrow 4} (x-4)^2 = 0$ 이므로

$$\lim_{x \rightarrow 4} \{f(x) - 2(x-4)f(4)\} = f(4) = 0$$

$f(x) = (x-4)(x^2 + ax + b)$ 라 두고 $\textcircled{1}$ 에 대입하면

$$h'(4) = \lim_{x \rightarrow 4} \frac{(x-4)(x^2 + ax + b)}{(x-4)^2}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 4} \frac{x^2 + ax + b}{x - 4} \dots \textcircled{2}$$

이고 $\lim_{x \rightarrow 4} (x-4) = 0$ 이므로

$$\lim_{x \rightarrow 4} (x^2 + ax + b) = 16 + 4a + b = 0$$

$b = -4a - 16$ 이고 이를 $\textcircled{2}$ 에 대입하면

$$h'(4) = \lim_{x \rightarrow 4} \frac{x^2 + ax - 4a - 16}{x - 4}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 4} \frac{(x-4)(x+a+4)}{x - 4}$$

$$= a + 8 = 6$$

에서 $a = -2, b = -8$ 이다.

$$\therefore f(x) = (x-4)^2(x+2)$$


따라서 $f(0) = 16 \times 2 = 32$

30. [출제의도] 함수의 극한을 활용하여 문제해결하기

$$g(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\{f(x)\}^{2n+1} - 1}{\{f(x)\}^{2n} + 1}$$

- i) $|f(x)| > 1$ 일 때, $g(x) = f(x)$
- ii) $|f(x)| < 1$ 일 때, $g(x) = -1$
- iii) $f(x) = 1$ 일 때, $g(x) = 0$
- iv) $f(x) = -1$ 일 때, $g(x) = -1$

그러므로 함수 $g(x)$ 의 그래프는 그림과 같다.




방정식 $mg(x) = x + m$ 의 실근의 개수는

함수 $y = g(x)$ 의 그래프와 직선 $y = \frac{1}{m}x + 1$ 이

만나는 점의 개수와 같다.

(i) $m = 2k - 1$ (k 는 자연수)인 경우

(a) $x \geq 0$ 일 때,



직선 $y = \frac{1}{m}x + 1$ 이 함수 $y = g(x)$ 의 그래프 위에

있지 않은 점 $(4k-2, 3)$ 을 지난다.

$k = 1$ 일 때, 만나는 점의 개수는 1

$k \geq 2$ 일 때,

함수 $y = g(x)$ 의 그래프와 직선 $y = \frac{1}{m}x + 1$ 이

만나는 점의 개수는 구간 $(0, 1)$ 에서 1,


구간 $(4l-5, 4l-3)$ ($l = 2, 3, \dots, k$)에서 각각 2이다.

그러므로 함수 $y = g(x)$ 의 그래프와

직선 $y = \frac{1}{m}x + 1$ 이 만나는 점의 개수는

$$1 + 2(k-1) = 2k - 1$$

(b) $x < 0$ 일 때,



직선 $y = \frac{1}{m}x + 1$ 이

점 $(-2k+1, 0)$ 과 $(-4k+2, -1)$ 을 지나므로

함수 $y = g(x)$ 의 그래프와 직선 $y = \frac{1}{m}x + 1$ 이


만나는 점의 개수는 2이다.

(a), (b)에 의하여

$$a_{2k-1} = (2k-1) + 2 = 2k + 1$$

(ii) $m = 2k$ (k 는 자연수)인 경우

(a) $x \geq 0$ 일 때,



직선 $y = \frac{1}{m}x + 1$ 이 함수 $y = g(x)$ 의 그래프 위의

점 $(4k, 3)$ 을 지난다.

$k = 1$ 일 때, 만나는 점의 개수는 2

$k \geq 2$ 일 때,

함수 $y = g(x)$ 의 그래프와 직선 $y = \frac{1}{m}x + 1$ 이

만나는 점의 개수는 구간 $(0, 1)$ 에서 1,


구간 $(4l'-5, 4l'-3)$ ($l' = 2, 3, \dots, k$)에서 각각 2이다.

그러므로 함수 $y = g(x)$ 의 그래프와

직선 $y = \frac{1}{m}x + 1$ 이 만나는 점의 개수는

$$1 + 2(k-1) + 1 = 2k$$

(b) $x < 0$ 일 때,



직선 $y = \frac{1}{m}x + 1$ 이 점 $(-2k, 0)$ 과

$(-4k, -1)$ 을 지나므로 함수 $y = g(x)$ 의

그래프와 직선 $y = \frac{1}{m}x + 1$ 은 만나지 않는다.

그러므로 함수 $y = g(x)$ 의 그래프와

직선 $y = \frac{1}{m}x + 1$ 이 만나는 점의 개수는 0이다.

(a), (b)에 의하여

$$a_{2k} = 2k + 0 = 2k$$

(i)과 (ii)에 의하여

$$a_{2k-1} = 2k + 1, a_{2k} = 2k \text{ (k 는 자연수)이며}$$

$$a_{2k-1} + a_{2k} = b_k \text{ 라 하면 } b_k = 4k + 1$$

따라서

$$\sum_{m=1}^{21} a_m = \sum_{m=1}^{20} a_m + a_{21}$$

$$= \sum_{k=1}^{10} b_k + a_{21}$$

$$= \sum_{k=1}^{10} (4k + 1) + 23$$

$$= 4 \times \frac{10 \times 11}{2} + 10 + 23 = 253$$

|