

수학 영역

정답

1	④	2	⑤	3	⑤	4	③	5	②
6	④	7	①	8	②	9	②	10	③
11	①	12	③	13	①	14	⑤	15	④
16	9	17	20	18	65	19	22	20	54
21	13	22	182						

해설

- [출제의도]** 지수 계산하기
 $4^{1-\sqrt{3}} \times 2^{2\sqrt{3}-1} = 2^{2(1-\sqrt{3})} \times 2^{2\sqrt{3}-1}$
 $= 2^{2-2\sqrt{3}+2\sqrt{3}-1}$
 $= 2$
- [출제의도]** 미분계수 계산하기
 $f'(x) = 3x^2 - 7$ 이므로
 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(2+h) - f(2)}{h} = f'(2) = 5$
- [출제의도]** 삼각함수의 성질 이해하기
 $\sin\left(\frac{\pi}{2} + \theta\right) = \cos\theta = \frac{3}{5}$
 $\sin^2\theta = 1 - \cos^2\theta = \frac{16}{25}$
 $\sin\theta \cos\theta < 0$ 이므로 $\sin\theta = -\frac{4}{5}$
따라서 $\sin\theta + 2\cos\theta = \left(-\frac{4}{5}\right) + \frac{6}{5} = \frac{2}{5}$
- [출제의도]** 함수의 극한 이해하기
 $\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = 0, \lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) = 1$
따라서 $\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) + \lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) = 0 + 1 = 1$
- [출제의도]** 함수의 미분가능성 이해하기
함수 $f(x)$ 가 $x = 1$ 에서 미분가능하므로
 $x = 1$ 에서 연속이다.
 $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = f(1)$
 $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} (3x + a) = a + 3$
 $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} (2x^3 + bx + 1) = b + 3$
 $f(1) = a + 3$
 $a + 3 = b + 3, a = b$
함수 $f(x)$ 가 $x = 1$ 에서 미분가능하므로
 $\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1}$
 $\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{3x + a - (a + 3)}{x - 1} = 3$
 $\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1}$
 $= \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{(2x^3 + ax + 1) - (a + 3)}{x - 1}$
 $= \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{(x - 1)(2x^2 + 2x + a + 2)}{x - 1} = a + 6$
 $3 = a + 6, a = -3, b = -3$
따라서 $a + b = -6$


- [출제의도]** 등비수열의 일반항 계산하기
등비수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항을 a , 공비를 r 라 하자.
 $a_n = ar^{n-1}$ (단, n 은 자연수)
 $a_3^2 = a_6$ 이므로 $(ar^2)^2 = ar^5, ar^4(a-r) = 0,$
 $a = r, a_n = r^n$
 $a_2 - a_1 = 2$ 이므로 $r^2 - r = 2$
 $(r-2)(r+1) = 0$
 $r = 2$ 또는 $r = -1$
모든 항이 양수이므로 $r = 2$
따라서 $a_5 = r^5 = 32$

- [출제의도]** 함수의 극대와 극소를 활용하여 문제 해결하기
함수 $f(x)$ 가 $x = 1$ 에서 극값을 가지므로
 $f'(1) = 0$
 $f'(x) = 3x^2 + 2ax - 9$ 에서
 $f'(1) = 3 + 2a - 9 = 0$ 이므로 $a = 3$
 $f'(x) = 3x^2 + 6x - 9 = 3(x-1)(x+3)$
함수 $f(x)$ 는 $x = -3$ 에서 극댓값을 갖는다.
따라서 $f(-3) = -27 + 27 + 27 + 4 = 31$

- [출제의도]** 정적분을 활용하여 속도와 거리 문제 해결하기
점 P 가 운동 방향을 바꿀 때 $v(t) = 0$
 $v(t) = t^2 - 4t + 3 = (t-1)(t-3) = 0$
점 P 가 $t = 1, t = 3$ 에서 운동 방향을 바꾸므로 $a = 3$
점 P 가 시각 $t = 0$ 에서 $t = 3$ 까지 움직인 거리는
 $\int_0^3 |v(t)| dt$
 $= \int_0^1 v(t) dt + \int_1^3 \{-v(t)\} dt$
 $= \int_0^1 (t^2 - 4t + 3) dt + \int_1^3 (-t^2 + 4t - 3) dt$
 $= \left[\frac{1}{3}t^3 - 2t^2 + 3t\right]_0^1 + \left[-\frac{1}{3}t^3 + 2t^2 - 3t\right]_1^3$
 $= \frac{4}{3} + \frac{4}{3} = \frac{8}{3}$

- [출제의도]** 거듭제곱근 이해하기
(i) n 이 짝수일 때
 $(x^n - 8)(x^{2n} - 8) = 0$ 의 실근은
 $x = \pm \sqrt[n]{8}$ 또는 $x = \pm \sqrt[2n]{8}$
모든 실근의 곱이 양수이므로 모순
(ii) n 이 홀수일 때
 $(x^n - 8)(x^{2n} - 8) = 0$ 의 실근은
 $x = \sqrt[n]{8}$ 또는 $x = \pm \sqrt[2n]{8}$
모든 실근의 곱은
 $\frac{3}{2^n} \times 2^{\frac{3}{2n}} \times \left(-2^{\frac{3}{2n}}\right) = -2^{\frac{6}{2n}} = -4$
 $\frac{6}{2^n} = 2^2, \frac{6}{n} = 2$
따라서 (i), (ii)에 의하여 $n = 3$

- [출제의도]** 삼각함수의 그래프 이해하기
삼각함수 $y = 4\sin 3x + 2$ 는
주기가 $\frac{2}{3}\pi$, 최댓값이 6, 최솟값이 -2 이므로
 $0 \leq x < 2\pi$ 일 때, 곡선 $y = |4\sin 3x + 2|$ 는 다음과 같다.



따라서 $0 \leq x < 2\pi$ 일 때,
곡선 $y = |4\sin 3x + 2|$ 와 직선 $y = 2$ 가 만나서 서로 다른 점의 개수는 9

- [출제의도]** 정적분의 정의 이해하기
 $f(1+x) + f(1-x) = 0$ 에 $x = 0$ 을 대입하면
 $f(1) = 0$
 $f(x) = (x-1)(x^2 + ax + b)$ (단, a, b 는 상수)
조건 (나)에서
 $\int_{-1}^3 f'(x) dx = f(3) - f(-1) = 12 \dots \textcircled{1}$
 $f(1+x) + f(1-x) = 0$ 에 $x = 2$ 를 대입하면
 $f(3) + f(-1) = 0 \dots \textcircled{2}$
두 식 $\textcircled{1}, \textcircled{2}$ 을 연립하면
 $f(3) = 6, f(-1) = -6$
 $f(3) = 2(9 + 3a + b) = 6, 3a + b = -6 \dots \textcircled{3}$
 $f(-1) = -2(1 - a + b) = -6, a - b = -2 \dots \textcircled{4}$
두 식 $\textcircled{3}, \textcircled{4}$ 을 연립하면 $a = -2, b = 0$
 $f(x) = x(x-1)(x-2)$
따라서 $f(4) = 24$

- [출제의도]** 여러 가지 수열의 합을 활용하여 문제 해결하기
등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항을 a 라 하자.
조건 (가)에 의하여
 $\sum_{k=1}^{2m+1} a_k = \frac{(2m+1)\{2a + 5 \times (2m+1-1)\}}{2}$
 $= (2m+1)(a + 5m) < 0$
 $2m+1 > 0$ 이므로 $a + 5m = a_{m+1} < 0$
(i) $a_{m+1} = -1$ 인 경우
 $|a_m| + |a_{m+1}| + |a_{m+2}| = 11$ 이므로
조건 (나)를 만족시킨다.
 $a_{m+1} = -1$ 이므로
 $a_{m+6} = 24, a_{m+7} = 29$
 $24 < a_{21} < 29$ 인 a_{21} 이 존재하지 않는다.
(ii) $a_{m+1} = -2$ 인 경우
 $|a_m| + |a_{m+1}| + |a_{m+2}| = 12$ 이므로
조건 (나)를 만족시킨다.
 $a_{m+1} = -2$ 이므로 $a_{m+7} = 28$
따라서 $m+7 = 21$ 이므로 $m = 14$
(iii) $a_{m+1} \leq -3$ 인 경우
 $|a_m| + |a_{m+1}| + |a_{m+2}| \geq 13$ 이므로
조건 (나)를 만족시키지 않는다.
따라서 (i), (ii), (iii)에 의하여 $m = 14$

- [출제의도]** 사인법칙과 코사인법칙을 활용하여 문제 해결하기

$\angle AFC = \alpha$, $\angle CDE = \beta$ 라 하자.
 $\cos \alpha = \frac{\sqrt{10}}{10}$ 이므로 $\sin \alpha = \frac{3\sqrt{10}}{10}$
 $\angle ECD = \angle EFB = \pi - \alpha$
삼각형 CDE 에서 사인법칙에 의하여
 $\frac{\overline{ED}}{\sin(\pi - \alpha)} = \frac{\overline{EC}}{\sin \beta} = 10\sqrt{2}$
 $\overline{ED} = 10\sqrt{2} \times \sin \alpha = 10\sqrt{2} \times \frac{3\sqrt{10}}{10} = 6\sqrt{5}$
 $\sin \beta = \frac{\sqrt{2}}{2}$, $\beta = \frac{\pi}{4}$
 $\overline{CD} = x$ 라 하자.
삼각형 CDE 에서 코사인법칙에 의하여
 $180 = x^2 + 100 - 2 \times x \times 10 \times \cos(\pi - \alpha)$
 $= x^2 + 100 + 2 \times x \times 10 \times \cos \alpha$
 $= x^2 + 2\sqrt{10}x + 100$
 $x^2 + 2\sqrt{10}x - 80 = 0$ 이고 $x > 0$ 이므로
 $x = -\sqrt{10} + \sqrt{10 + 80} = 2\sqrt{10}$
 $\angle ABE = \angle CDE = \frac{\pi}{4}$ 이므로
삼각형 ABE 는 직각이등변삼각형이다.
 $\overline{AB} = 2\sqrt{10}$ 이므로 $\overline{BE} = \overline{AE} = 2\sqrt{5}$
두 삼각형 BEF, DEC 는 서로 닮음이고
닮음비가 1:3 이다.
 $\overline{AF} = \frac{2}{3} \times \overline{AB} = \frac{4\sqrt{10}}{3}$
따라서 삼각형 AFE 의 넓이는
 $\frac{1}{2} \times \overline{AF} \times \overline{AE} \times \sin \frac{\pi}{4}$
 $= \frac{1}{2} \times \frac{4\sqrt{10}}{3} \times 2\sqrt{5} \times \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{20}{3}$

14. [출제의도] 연속함수의 성질을 활용하여 추론하기

ㄱ. $\lim_{x \rightarrow 0^-} g(x)g(x-3) = -f(0) \times f(-3)$
 $\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x)g(x-3) = f(0) \times \{-f(-3)\}$
 $g(0)g(-3) = f(0) \times \{-f(-3)\}$
함수 $g(x)g(x-3)$ 은 $x=0$ 에서 연속이다. (참)
ㄴ. 함수 $g(x)g(x-3)$ 이 $x=k$ 에서 불연속인
실수 k 의 값이 한 개이므로
 $k = -3$ 또는 $k = 3$
(i) 함수 $g(x)g(x-3)$ 이 $x = -3$ 에서
연속이고, $x = 3$ 에서 불연속인 경우
 $\lim_{x \rightarrow -3^-} g(x)g(x-3) = f(-3) \times f(-6)$
 $\lim_{x \rightarrow -3^+} g(x)g(x-3) = -f(-3) \times f(-6)$
 $g(-3)g(-6) = -f(-3) \times f(-6)$ 이므로
 $f(-3) \times f(-6) = 0 \dots \textcircled{1}$
 $\lim_{x \rightarrow 3^-} g(x)g(x-3) = f(3) \times \{-f(0)\}$
 $\lim_{x \rightarrow 3^+} g(x)g(x-3) = f(3) \times f(0)$
 $g(3)g(0) = f(3) \times f(0)$ 이므로
 $f(3) \times f(0) \neq 0 \dots \textcircled{2}$
 $f(-3) = f(0)$ 이므로
 $\textcircled{1}, \textcircled{2}$ 에 의하여 $f(-6) = 0$
(ii) 함수 $g(x)g(x-3)$ 이 $x = 3$ 에서 연속이고,
 $x = -3$ 에서 불연속인 경우
(i) 과 같은 방법에 의하여 $f(3) = 0$
(i), (ii)에 의하여 $f(-6) = 0$ 또는
 $f(3) = 0$ 이므로 $f(-6) \times f(3) = 0$ (참)

ㄷ. $k = -3$ 이므로 $f(3) = 0$
 $f(x) = (x-3)(x^2 + ax + b)$ 라 하자.
(단, a, b 는 상수)
 $f(-3) = f(0)$ 이므로
 $-6(9 - 3a + b) = -3b$, $b = 6a - 18$
 $f(x) = (x-3)(x^2 + ax + 6a - 18)$
(i) 방정식 $x^2 + ax + 6a - 18 = 0$ 이 3 이 아닌
서로 다른 두 실근을 갖는 경우
방정식 $f(x) = 0$ 의 세 실근의 합은
 $3 + (-a) = -1$, $a = 4$
방정식 $x^2 + 4x + 6 = 0$ 은 실근을 갖지
않으므로 모순
(ii) 방정식 $x^2 + ax + 6a - 18 = 0$ 이 중근을
갖는 경우
방정식 $f(x) = 0$ 의 서로 다른 두 실근의 합은
 $3 + \left(-\frac{a}{2}\right) = -1$, $a = 8$
방정식 $x^2 + 8x + 30 = 0$ 은 중근을 갖지
않으므로 모순
(iii) 방정식 $x^2 + ax + 6a - 18 = 0$ 이
3 과 -4 를 실근으로 갖는 경우
 $3 + (-4) = -a$, $3 \times (-4) = 6a - 18$ 에서
 $a = 1$
 $f(x) = (x-3)(x^2 + x - 12) = (x-3)^2(x+4)$
그러므로 $g(-1) = -f(-1) = -48$ (참)
따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ, ㄷ

15. [출제의도] 수열의 귀납적 정의를 활용하여 추론하기

(i) $4 \leq n \leq 7$ 인 모든 자연수 n 에 대하여
 $\log_3 a_n$ 이 자연수가 아닌 경우
 $a_5 = a_4 + 6$, $a_6 = a_5 + 6 = a_4 + 12$,
 $a_7 = a_6 + 6 = a_4 + 18$ 이므로
 $\sum_{k=4}^7 a_k = 4a_4 + 36 = 40$, $a_4 = 1$
순서쌍 (a_1, a_2, a_3) 은 $(27, 9, 3)$
그러므로 $a_1 = 27$
(ii) $4 \leq n \leq 7$ 인 자연수 n 에 대하여
 $\log_3 a_n$ 이 자연수인 n 이 존재하는 경우
 $a_n = 3^m$ (m 은 자연수)인 n ($4 \leq n \leq 7$) 이
존재한다.
 a_4, a_5, a_6, a_7 중 3^m ($m \geq 4$) 가 존재하면
 $\sum_{k=4}^7 a_k > 40$ 이므로 주어진 조건을
만족시키지 않는다.
그러므로 a_4, a_5, a_6, a_7 중 3^m ($m \geq 4$) 가
존재하지 않는다.
또한 a_4, a_5, a_6, a_7 중 27 이 존재하지
않으면 $n = 4, 5, 6, 7$ 에 대하여
 $\sum_{k=4}^7 a_k < 40$
그러므로 a_4, a_5, a_6, a_7 중 하나가 27 이다.
만약 a_5, a_6, a_7 중 하나가 27 이면
 $\sum_{k=4}^7 a_k > 40$ 이므로 $a_4 = 27$
 $a_4 + a_5 + a_6 + a_7 = 27 + 9 + 3 + 1 = 40$
그러므로 $a_4 = 27$ 일 때 조건을 만족시킨다.

$a_1 < 300$ 을 만족시키는
순서쌍 (a_1, a_2, a_3) 은
 $(69, 75, 81)$, $(237, 243, 81)$ 이므로
 $a_1 = 69$ 또는 $a_1 = 237$
따라서 (i), (ii)에 의하여
모든 a_1 의 값의 합은 $27 + 69 + 237 = 333$

16. [출제의도] 로그함수의 성질 이해하기

로그의 진수 조건에 의하여
 $x - 5 > 0$ 이고 $x + 7 > 0$ 이므로 $x > 5 \dots \textcircled{1}$
 $\log_4(x-5)^2 = \log_4(x+7)$, $(x-5)^2 = x+7$
 $x^2 - 10x + 25 = x+7$, $x^2 - 11x + 18 = 0$
 $(x-2)(x-9) = 0$, $x = 2$ 또는 $x = 9$
 $\textcircled{1}$ 에 의하여 $x = 9$

17. [출제의도] 부정적분 계산하기

$f(x) = \int (9x^2 - 8x + 1)dx$
 $= 3x^3 - 4x^2 + x + C$ (단, C 는 적분상수)
 $f(1) = 3 - 4 + 1 + C = 10$, $C = 10$
 $f(x) = 3x^3 - 4x^2 + x + 10$
따라서 $f(2) = 24 - 16 + 2 + 10 = 20$

18. [출제의도] 여러 가지 수열의 합 이해하기

$\sum_{k=1}^{10} (2a_k + 3) = 2 \sum_{k=1}^{10} a_k + \sum_{k=1}^{10} 3 = 40$, $\sum_{k=1}^{10} a_k = 5$
 $\sum_{k=1}^{10} (a_k - b_k) = \sum_{k=1}^{10} a_k - \sum_{k=1}^{10} b_k = -10$
 $\sum_{k=1}^{10} b_k = 15$
따라서 $\sum_{k=1}^{10} (b_k + 5) = \sum_{k=1}^{10} b_k + \sum_{k=1}^{10} 5 = 65$


19. [출제의도] 접선의 방정식을 활용하여 문제 해결하기

$f(x) = x^3 - 10$, $g(x) = x^3 + k$ 라 하자.
 $f'(x) = 3x^2$ 이므로
곡선 $y = f(x)$ 위의 점 $P(-2, -18)$ 에서의
접선의 기울기는 $f'(-2) = 12$
접선의 방정식은
 $y - (-18) = 12\{x - (-2)\}$, $y = 12x + 6$
점 Q 의 좌표를 $(\alpha, \alpha^3 + k)$ 라 하자.
(단, α 는 상수)
 $g'(x) = 3x^2$ 이므로
곡선 $y = g(x)$ 위의 점 Q $(\alpha, \alpha^3 + k)$ 에서의
접선의 기울기는 $g'(\alpha) = 3\alpha^2$
접선의 방정식은 $y - (\alpha^3 + k) = 3\alpha^2(x - \alpha)$,
 $y = 3\alpha^2x - 2\alpha^3 + k$
두 접선이 일치하므로 $3\alpha^2 = 12$, $-2\alpha^3 + k = 6$
 $\alpha = 2$ 이면 $k = 22$, $\alpha = -2$ 이면 $k = -10$
 $k > 0$ 이므로 $k = 22$

20. [출제의도] 정적분을 활용하여 문제 해결하기

$f(x) = |x^2 - 3| - 2x$
 $= \begin{cases} x^2 - 2x - 3 & (x \leq -\sqrt{3} \\ & \text{또는 } x \geq \sqrt{3}) \\ -x^2 - 2x + 3 & (-\sqrt{3} < x < \sqrt{3}) \end{cases}$

x_1, x_4 는 이차방정식 $x^2 - 2x - 3 = -x + t$ 의 두 근이므로 근과 계수와의 관계에 의하여
 $x_1 + x_4 = 1, x_1 x_4 = -t - 3$
 $x_4 - x_1 = 5$ 이므로 $x_1 = -2, x_4 = 3$
 $x_1 x_4 = -t - 3 = -6, t = 3$
 x_2, x_3 은 이차방정식 $-x^2 - 2x + 3 = -x + 3$ 의 두 근이므로 $x_2 = -1, x_3 = 0$



단한구간 $[0, 3]$ 에서 두 함수 $y=f(x), y=g(x)$ 의 그래프로 둘러싸인 부분의 넓이는
 $\int_0^3 |f(x) - g(x)| dx$
 $= \int_0^{\sqrt{3}} \{(-x+3) - (-x^2-2x+3)\} dx$
 $+ \int_{\sqrt{3}}^3 \{(-x+3) - (x^2-2x-3)\} dx$
 $= \left[\frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{2}x^2 \right]_0^{\sqrt{3}} + \left[-\frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{2}x^2 + 6x \right]_{\sqrt{3}}^3$
 $= \frac{27}{2} - 4\sqrt{3}$

따라서 $p \times q = \frac{27}{2} \times 4 = 54$


21. [출제의도] 지수함수의 그래프를 활용하여 문제 해결하기

점 D의 좌표를 $(t, 0) (t > 0)$ 이라 하자.
 점 D는 선분 CA를 5:3으로 외분하는 점이므로 $\overline{CA} : \overline{AD} = 2 : 3$
 점 A의 x좌표는 $\frac{2}{5}t, A\left(\frac{2}{5}t, \frac{6}{5}t\right)$
 점 C의 y좌표는 $2t, C(0, 2t)$
 직선 BC의 방정식은 $y = -\frac{1}{3}x + 2t$
 점 B는 두 직선 $y = 3x, y = -\frac{1}{3}x + 2t$ 의 교점이므로 $B\left(\frac{3}{5}t, \frac{9}{5}t\right)$
 $\overline{AB} = \overline{BC} = \frac{\sqrt{10}}{5}t$
 삼각형 ABC의 넓이는
 $\frac{1}{2} \times \overline{AB} \times \overline{BC} = \frac{1}{2} \times \left(\frac{\sqrt{10}}{5}t\right)^2 = \frac{t^2}{5} = 20$
 $t^2 = 100$ 이므로 $t = 10$
 $A(4, 12), B(6, 18)$ 이므로



$12 = 2^{4-m} + n, 18 = 2^{6-m} + n$
 $18 - 2^{6-m} = 12 - 2^{4-m}$
 $2^{6-m} - 2^{4-m} = 6$
 $64 \times 2^{-m} - 16 \times 2^{-m} = 6$
 $48 \times 2^{-m} = 6, 2^{-m} = \frac{1}{8}$
 $m = 3, n = 10$
 따라서 $m + n = 13$

22. [출제의도] 접선의 방정식과 그래프의 개형을 활용하여 문제 해결하기


방정식 $g(x) = 0$ 에서
 $x = t$ 일 때 $f(t) - t - f(t) + t = 0$ 이므로 $g(t) = 0$
 $x \neq t$ 일 때 $f(x) - x - f(t) + t = 0$ 에서
 $\frac{f(x) - f(t)}{x - t} = 1$ 이다.
 그러므로 함수 $h(t)$ 는 곡선 $y = f(x)$ 위의 한 점 $(t, f(t))$ 를 지나고 기울기가 1인 직선 l 과 곡선 $y = f(x)$ 의 교점의 개수이다.
 임의의 실수 s 에 대하여 $h(s) \geq 1$ 이다.
 (i) $h(s) = 1$ 인 경우




(ii) $h(s) = 2$ 인 경우



(iii) $h(s) \geq 3$ 인 경우
 $\lim_{t \rightarrow s} h(t) = 4$ 이거나 극한값이 존재하지 않는다.
 (i), (ii), (iii)에 의하여
 곡선 $y = f(x)$ 와 직선 l 이 두 점 $(-1, f(-1)), (1, f(1))$ 에서 접할 때
 $\lim_{t \rightarrow -1} \{h(t) - h(-1)\} = \lim_{t \rightarrow 1} \{h(t) - h(1)\} = 2$ 를 만족시킨다.



함수 $f(x)$ 의 최고차항의 계수를 a , 직선 l 의 방정식을 $y = x + b$ 라 하자.
 (단, a, b 는 상수)
 $f(x) - (x + b) = a(x - 1)^2(x + 1)^2$
 $f(x) = a(x - 1)^2(x + 1)^2 + x + b$
 조건 (나)에서 $\int_0^\alpha \{f(x) - |f(x)|\} dx = 0$ 을 만족시키는 실수 α 의 최솟값이 -1 이므로
 $-1 \leq x \leq 0$ 에서 $f(x) \geq 0, f(-1) \geq 0$
 $f(-1) > 0$ 이면 실수 α 의 최솟값이 -1 이 아니므로 $f(-1) = 0$
 $f(-1) = -1 + b = 0, b = 1$
 $f(x) = a(x - 1)^2(x + 1)^2 + x + 1$
 조건 (다)에서
 $\frac{d}{dx} \int_0^x \{f(u) - ku\} du = f(x) - kx \geq 0$
 $f(x) \geq kx$ 이므로 곡선 $y = f(x)$ 와 직선 $y = kx$ 가 접하거나 만나지 않는다.
 실수 k 의 최댓값이 $f'(\sqrt{2})$ 이므로 그림과 같이 곡선 $y = f(x)$ 와 직선 $y = f'(\sqrt{2})x$ 가 점 $(\sqrt{2}, f(\sqrt{2}))$ 에서 접한다.



$f(x) = a(x - 1)^2(x + 1)^2 + x + 1$
 $= ax^4 - 2ax^2 + x + a + 1$
 $f'(x) = 4ax^3 - 4ax + 1$
 $f(\sqrt{2}) = 4a - 4a + \sqrt{2} + a + 1 = a + \sqrt{2} + 1$
 $f'(\sqrt{2}) = 8\sqrt{2}a - 4\sqrt{2}a + 1 = 4\sqrt{2}a + 1$
 $f(\sqrt{2}) = f'(\sqrt{2}) \times \sqrt{2}$ 이므로
 $a + \sqrt{2} + 1 = (4\sqrt{2}a + 1) \times \sqrt{2}$
 $= 8a + \sqrt{2}$
 $a = \frac{1}{7}, f(x) = \frac{1}{7}(x - 1)^2(x + 1)^2 + x + 1$
 따라서 $f(6) = \frac{1}{7} \times 5^2 \times 7^2 + 6 + 1 = 182$

확률과 통계 정답

23	③	24	①	25	②	26	④	27	⑤
28	①	29	24	30	150				

확률과 통계 해설

23. [출제의도] 이항계수 계산하기

다항식 $(x^2 + 2)^6$ 의 전개식의 일반항은 ${}_6C_r \times (x^2)^{6-r} \times 2^r = {}_6C_r \times 2^r \times x^{12-2r}$ ($r=0, 1, 2, \dots, 6$)
 x^8 의 계수는 $r=2$ 일 때이다.
 따라서 ${}_6C_2 \times 2^2 = 15 \times 4 = 60$

24. [출제의도] 독립시행의 확률 이해하기

한 개의 주사위를 네 번 던질 때 나오는 네 눈의 수의 곱이 27의 배수이려면 3의 배수의 눈이 세 번 또는 네 번 나와야 한다.
 한 개의 주사위를 한 번 던질 때,
 3의 배수의 눈이 나오는 확률은 $\frac{2}{6} = \frac{1}{3}$
 한 개의 주사위를 네 번 던질 때, 3의 배수의 눈이 나오는 횟수를 X ($X=0, 1, 2, 3, 4$)라 하면

$$P(X=3) = {}_4C_3 \left(\frac{1}{3}\right)^3 \left(\frac{2}{3}\right)^1 = \frac{8}{81}$$

$$P(X=4) = {}_4C_4 \left(\frac{1}{3}\right)^4 \left(\frac{2}{3}\right)^0 = \frac{1}{81}$$

$$\text{따라서 } \frac{8}{81} + \frac{1}{81} = \frac{1}{9}$$

25. [출제의도] 확률분포 이해하기

주어진 확률분포에서 $a + (a+b) + b = 1$
 $a + b = \frac{1}{2} \dots \textcircled{A}$
 $E(X^2) = a + 4(a+b) + 9b = a + 5$
 $4a + 13b = 5 \dots \textcircled{B}$
 두 식 $\textcircled{A}, \textcircled{B}$ 을 연립하면 $a = \frac{1}{6}, b = \frac{1}{3}$
 따라서 $b - a = \frac{1}{6}$

26. [출제의도] 여사건의 확률 이해하기

주머니 A에서 임의로 꺼낸 1개의 공이 흰 공인 사건을 X , 주머니 B에서 임의로 꺼낸 3개의 공 중에서 적어도 한 개가 흰 공인 사건을 Y 라 하자.
 $P(X) = \frac{1}{3}, P(X^c) = 1 - \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$
 (i) 주머니 A에서 임의로 꺼낸 공이 흰 공일 때 주머니 B에서 임의로 꺼낸 3개의 공 중에서 적어도 한 개가 흰 공일 확률은 $1 - \frac{{}_3C_3}{{}_7C_3} = 1 - \frac{1}{35} = \frac{34}{35}$
 (ii) 주머니 A에서 임의로 꺼낸 공이 검은 공일 때 주머니 B에서 임의로 꺼낸 3개의 공 중에서 적어도 한 개가 흰 공일 확률은 $1 - \frac{{}_4C_3}{{}_7C_3} = 1 - \frac{4}{35} = \frac{31}{35}$

따라서 (i), (ii)에 의하여

$$\begin{aligned} P(Y) &= P(X \cap Y) + P(X^c \cap Y) \\ &= P(X)P(Y|X) + P(X^c)P(Y|X^c) \\ &= \frac{1}{3} \times \frac{34}{35} + \frac{2}{3} \times \frac{31}{35} = \frac{32}{35} \end{aligned}$$

27. [출제의도] 같은 것이 있는 순열 이해하기
 주어진 7장의 카드를 일렬로 나열할 때, 이웃하는 두 카드에 적힌 수의 곱이 모두 1 이하가 되도록 나열하려면 ①, ②와 ②, ③은 각각 서로 이웃하지 않아야 한다.

(i) ①, ①이 서로 이웃하지 않는 경우 ②, ②, ② 사이와 양 끝에 ①, ①, ②, ②를 하나씩 넣는 경우의 수와 같으므로 $\frac{4!}{2!2!} = 6$
 (ii) ①, ①이 서로 이웃하는 경우 ②, ②, ② 사이와 양 끝에 ①, ①을 이웃하게 넣는 경우의 수는 ${}_4C_1 = 4$
 남은 자리에 ②, ②를 하나씩 넣는 경우의 수는 ${}_3C_2 = 3$
 그러므로 $4 \times 3 = 12$
 따라서 (i), (ii)에 의하여 $6 + 12 = 18$


28. [출제의도] 조건부확률을 활용하여 문제 해결하기

$a_k \leq k$ 를 만족시키는 자연수 k ($1 \leq k \leq 5$)의 최솟값이 3인 사건을 A ,
 $a_1 + a_2 = a_4 + a_5$ 인 사건을 B 라 하자.
 $a_k \leq k$ 를 만족시키는 자연수 k ($1 \leq k \leq 5$)의 최솟값이 3이면, $a_1 > 1, a_2 > 2, a_3 \leq 3$ 이다.
 (I) $a_3 = 1$ 이고 $a_1 > 1, a_2 > 2$ 일 확률은 $\frac{3 \times 3 \times 2!}{5!} = \frac{3}{20}$
 (II) $a_3 = 2$ 이고 $a_1 > 1, a_2 > 2$ 일 확률은 $\frac{3 \times 2 \times 2!}{5!} = \frac{1}{10}$
 (III) $a_3 = 3$ 이고 $a_1 > 1, a_2 > 2$ 일 확률은 $\frac{2 \times 2 \times 2!}{5!} = \frac{1}{15}$
 (I), (II), (III)에 의하여
 $P(A) = \frac{3}{20} + \frac{1}{10} + \frac{1}{15} = \frac{9+6+4}{60} = \frac{19}{60}$
 $a_1 + a_2 = a_4 + a_5$ 이면
 $a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + a_5 = 15$ 에서
 $a_3 = 15 - 2(a_1 + a_2) = 2\{7 - (a_1 + a_2)\} + 1$
 이므로 a_3 의 값은 홀수이다.
 (i) $a_3 = 1$ 인 경우
 $a_1 + a_2 = 7$ 이므로 순서쌍 (a_1, a_2) 는 $(2, 5), (3, 4), (4, 3)$
 (ii) $a_3 = 3$ 인 경우
 $a_1 + a_2 = 6$ 이므로 순서쌍 (a_1, a_2) 는 $(2, 4)$
 (i), (ii)에 의하여
 $P(A \cap B) = \frac{(3+1) \times 2!}{5!} = \frac{1}{15}$

따라서 $P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{\frac{1}{15}}{\frac{19}{60}} = \frac{4}{19}$

29. [출제의도] 연속확률변수의 확률밀도함수를 활용하여 추론하기

$\{g(x) - f(x)\}\{g(x) - a\} = 0$ 이므로
 $g(x) = f(x)$ 또는 $g(x) = a$
 조건 (가)와 (나)에 의하여
 확률밀도함수 $y = g(x)$ 의 그래프는 그림과 같다.



$P(0 \leq Y \leq 4) = 1$ 이므로

$$\frac{1}{2} \times 2a \times a + (4-4a) \times a + \frac{1}{2} \times 2a \times a = 1$$

$$2a^2 - 4a + 1 = 0, a = \frac{2 \pm \sqrt{2}}{2}$$

$$0 < a < \frac{1}{2} \text{ 이므로 } a = \frac{2 - \sqrt{2}}{2}, 1 < 5a < 2$$

$$\begin{aligned} P(0 \leq Y \leq 5a) &= P(0 \leq Y \leq 2a) + P(2a \leq Y \leq 5a) \\ &= \frac{1}{2} \times 2a \times a + 3a \times a = 4a^2 \end{aligned}$$

$$= 4 \times \left(\frac{2 - \sqrt{2}}{2}\right)^2 = 6 - 4\sqrt{2}$$

$$\text{따라서 } p = 6, q = 4 \text{ 이므로 } p \times q = 24$$

30. [출제의도] 중복조합을 활용하여 문제 해결하기

조건 (가)에 의하여 순서쌍 $(f(1), f(7))$ 은 $(1, 4), (2, 5), (3, 6), (4, 7)$
 조건 (나)에 의하여 $f(1) \leq f(3) \leq f(5) \leq f(7)$ 이고 $f(2) \leq f(4) \leq f(6)$
 조건 (다)에 의하여 $|f(2) - f(1)|$ 과 $f(1) + f(3) + f(5) + f(7)$ 의 값은 모두 3의 배수인 자연수이다.

(i) $f(1) = 1, f(7) = 4$ 인 경우
 $f(3) + f(5) = 4$ 또는 $f(3) + f(5) = 7$
 순서쌍 $(f(3), f(5))$ 는 $(1, 3), (2, 2), (3, 4)$
 $f(1) = 1$ 이므로 $f(2) = 4$ 또는 $f(2) = 7$
 $f(2) = 4$ 이면 순서쌍 $(f(4), f(6))$ 의 개수는 ${}_4H_2$,
 $f(2) = 7$ 이면 순서쌍 $(f(4), f(6))$ 의 개수는 ${}_1H_2$
 ${}_4H_2 + {}_1H_2 = 10 + 1 = 11$
 그러므로 $3 \times 11 = 33$

(ii) $f(1) = 2, f(7) = 5$ 인 경우
 $f(3) + f(5) = 5$ 또는 $f(3) + f(5) = 8$
 순서쌍 $(f(3), f(5))$ 는 $(2, 3), (3, 5), (4, 4)$
 $f(1) = 2$ 이므로 $f(2) = 5$
 순서쌍 $(f(4), f(6))$ 의 개수는 ${}_3H_2 = 6$
 그러므로 $3 \times 6 = 18$

(iii) $f(1) = 3, f(7) = 6$ 인 경우
 $f(3) + f(5) = 6$ 또는 $f(3) + f(5) = 9$
 또는 $f(3) + f(5) = 12$
 순서쌍 $(f(3), f(5))$ 는 $(3, 3), (3, 6), (4, 5), (6, 6)$
 $f(1) = 3$ 이므로 $f(2) = 6$
 순서쌍 $(f(4), f(6))$ 의 개수는 ${}_2H_2 = 3$
 그러므로 $4 \times 3 = 12$

(iv) $f(1) = 4, f(7) = 7$ 인 경우
 $f(3) + f(5) = 10$ 또는 $f(3) + f(5) = 13$
 순서쌍 $(f(3), f(5))$ 는 $(4, 6), (5, 5), (6, 7)$
 $f(1) = 4$ 이므로 $f(2) = 1$ 또는 $f(2) = 7$
 $f(2) = 1$ 이면 순서쌍 $(f(4), f(6))$ 의 개수는 ${}_7H_2$
 $f(2) = 7$ 이면 순서쌍 $(f(4), f(6))$ 의 개수는 ${}_1H_2$
 ${}_7H_2 + {}_1H_2 = 28 + 1 = 29$
 그러므로 $3 \times 29 = 87$

따라서 (i), (ii), (iii), (iv)에 의하여 $33 + 18 + 12 + 87 = 150$