

수학 영역

※ 본 전국연합학력평가는 17개 시도교육청 주관
으로 시행되며, 문제지는 EBSi에서만 제공됩니다.
무단 전재 및 재배포는 금지됩니다.

정답

1	③	2	②	3	①	4	⑤	5	④
6	③	7	②	8	④	9	⑤	10	①
11	③	12	①	13	②	14	④	15	①
16	7	17	38	18	12	19	24	20	213
21	320	22	26						

해설

1. [출제의도] 지수 계산하기

$$5^{-\frac{1}{2}} \times 25^{\frac{3}{4}} = 5^{-\frac{1}{2}} \times (5^2)^{\frac{3}{4}} = 5^{-\frac{1}{2} + \frac{3}{2}} = 5$$

2. [출제의도] 미분계수 계산하기

$$f'(x) = 2x + 3$$

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(3+h) - f(3)}{h} = f'(3) = 9$$

3. [출제의도] 여러 가지 수열의 합 계산하기

$$\sum_{k=1}^5 (k + 3a_k) = \sum_{k=1}^5 k + 3 \sum_{k=1}^5 a_k$$

$$= \frac{5 \times 6}{2} + 3 \sum_{k=1}^5 a_k = 27$$

$$3 \sum_{k=1}^5 a_k = 27 - 15 = 12$$

$$\text{따라서 } \sum_{k=1}^5 a_k = 4$$

4. [출제의도] 함수의 연속 이해하기

함수 $f(x)$ 가 실수 전체의 집합에서
연속이므로 $x=1$ 에서 연속이다.

$$\lim_{x \rightarrow 1-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1+} f(x) = f(1)$$

$$\lim_{x \rightarrow 1-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1-} (2x + a) = 2 + a$$

$$\lim_{x \rightarrow 1+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1+} (x^2 - ax + 11) = 12 - a$$

$$f(1) = 12 - a$$

$$2 + a = 12 - a, \quad 2a = 10$$

$$\text{따라서 } a = 5$$

5. [출제의도] 곱의 미분법 이해하기

$$g'(x) = (2x + 2)f'(x) + (x^2 + 2x)f''(x)$$

$$g'(1) = 4f'(1) + 3f''(1) = 4 \times 2 + 3 \times 1 = 11$$

6. [출제의도] 로그의 성질 이해하기

$$\log_{\sqrt{a}} b = 6 \text{ 에서 } b = (\sqrt{a})^6 = a^3$$

$$\log_4 a + \log_2 b = \log_4 a + \log_4 b^2$$

$$= \log_4 ab^2$$

$$= \log_4 a(a^3)^2$$

$$= \log_4 a^7$$

$$= 7 \log_4 a = 14$$

$$\log_4 a = 2, \quad a = 4^2 = 16, \quad b = 16^3$$

$$\log_2 \frac{b}{a} = \log_2 \frac{16^3}{16} = \log_2 16^2 = \log_2 2^8 = 8$$

7. [출제의도] 정적분의 성질 이해하기

$$\int_0^2 f(x) dx - \int_0^{-2} f(x) dx$$

$$= \int_0^2 f(x) dx + \int_{-2}^0 f(x) dx$$

$$= \int_{-2}^2 f(x) dx = \frac{40}{3}$$

$$\int_{-2}^2 (x^3 + x^2 + a) dx = 2 \int_0^2 (x^2 + a) dx$$

$$= 2 \left[\frac{1}{3} x^3 + ax \right]_0^2$$

$$= \frac{16}{3} + 4a$$

$$\frac{16}{3} + 4a = \frac{40}{3}, \quad 4a = 8$$

$$\text{따라서 } a = 2$$

8. [출제의도] 삼각함수의 성질 이해하기

$$\cos\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) = \sin \theta \text{ 이므로}$$

$$2 \cos \theta + \sin \theta = 0$$

$$2 \cos \theta = -\sin \theta \quad \text{㉠}$$

$$4 \cos^2 \theta = \sin^2 \theta$$

$$\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1 \text{ 이므로}$$

$$4 \cos^2 \theta = 1 - \cos^2 \theta$$

$$\cos^2 \theta = \frac{1}{5}$$

$$\sin \theta < 0 \text{ 이므로}$$

$$\text{㉠에 의하여 } \cos \theta > 0$$

$$\text{따라서 } \cos \theta = \frac{\sqrt{5}}{5}$$

9. [출제의도] 접선의 방정식 이해하기

$$f'(x) = 6x^2 - 14x$$

함수 $y = f(x)$ 의 그래프 위의

점 $(t, f(t))$ ($t > 0$) 에서의 접선의 방정식은

$$y = f'(t)(x - t) + f(t)$$

$$y = (6t^2 - 14t)(x - t) + 2t^3 - 7t^2 + 1$$

접선이 점 $(0, 1)$ 을 지나므로

$$1 = (6t^2 - 14t)(0 - t) + 2t^3 - 7t^2 + 1$$

$$1 = -4t^3 + 7t^2 + 1$$

$$4t^3 - 7t^2 = t^2(4t - 7) = 0$$

$$\text{따라서 } t = \frac{7}{4}$$

10. [출제의도] 삼각함수의 그래프를 활용하여
문제 해결하기

$$\text{함수 } y = \cos \frac{\pi x}{a} \text{ 의 주기는 } \frac{2\pi}{\frac{\pi}{a}} = 2a$$

$$0 \leq x \leq 2a \text{ 에서 } \cos \frac{\pi x}{a} = \frac{1}{2}$$

$$\frac{\pi x}{a} = \frac{\pi}{3} \text{ 또는 } \frac{\pi x}{a} = \frac{5\pi}{3} \text{ 이므로}$$

$$x = \frac{a}{3} \text{ 또는 } x = \frac{5}{3}a$$

$$\text{점 A 의 좌표는 } \left(\frac{a}{3}, \frac{1}{2}\right)$$

$$\text{점 B 의 좌표는 } \left(\frac{5}{3}a, \frac{1}{2}\right)$$

$$0 \leq x \leq 2a \text{ 에서 } \cos \frac{\pi x}{a} = -\frac{1}{2}$$

$$\frac{\pi x}{a} = \frac{2\pi}{3} \text{ 또는 } \frac{\pi x}{a} = \frac{4\pi}{3} \text{ 이므로}$$

$$x = \frac{2}{3}a \text{ 또는 } x = \frac{4}{3}a$$

$$\text{점 C 의 좌표는 } \left(\frac{2}{3}a, -\frac{1}{2}\right)$$

$$\text{점 D 의 좌표는 } \left(\frac{4}{3}a, -\frac{1}{2}\right)$$

$$\overline{AB} = \frac{4}{3}a, \quad \overline{CD} = \frac{2}{3}a$$

사각형 ACDB 는 사다리꼴이므로

사각형 ACDB 의 넓이는

$$\frac{1}{2} \times \left(\frac{4}{3}a + \frac{2}{3}a\right) \times 1 = a = \frac{3}{2}$$

$$\overline{AB} = \frac{4}{3}a = 2$$

$$\text{따라서 } a \times \overline{AB} = \frac{3}{2} \times 2 = 3$$

11. [출제의도] 정적분을 활용하여 속도와 거리
문제 해결하기

시각이 t ($t \geq 0$) 일 때

점 P 의 위치를 $x(t)$ 라 하면 $x(0) = 0$

$$\neg. k=0 \text{ 이면, } v(t) = 3t^2 - 6t$$

$$x(1) = x(0) + \int_0^1 v(t) dt$$

$$= \int_0^1 (3t^2 - 6t) dt$$

$$= \left[t^3 - 3t^2\right]_0^1 = -2 \quad (\text{참})$$

$$\neg. k=2 \text{ 이면, } v(t) = 3t^2 - 6t + 2$$

시각 $t=0$ 에서 $t=3$ 까지 점 P 가 움직인

거리와 점 P 의 위치의 변화량이 같아지려면

$0 \leq t \leq 3$ 인 모든 t 에 대하여

$$v(t) \geq 0 \text{ 이어야 한다.}$$

$$v(1) = -1 \text{ 이므로}$$

시각 $t=0$ 에서 $t=3$ 까지 점 P 가 움직인

거리는 점 P 의 위치의 변화량과 같지 않다.

(거짓)

$$\neg. k=-9 \text{ 이면, } v(t) = 3t^2 - 6t - 9$$

$$3t^2 - 6t - 9 = 3(t+1)(t-3) \text{ 이므로}$$

시각 $t=0$ 에서 $t=4$ 까지 점 P 가 움직인

거리는

$$\int_0^4 |v(t)| dt$$

$$= \int_0^3 (-3t^2 + 6t + 9) dt + \int_3^4 (3t^2 - 6t - 9) dt$$

$$= \left[-t^3 + 3t^2 + 9t\right]_0^3 + \left[t^3 - 3t^2 - 9t\right]_3^4$$

$$= 27 + 7 = 34 \quad (\text{참})$$

따라서 옳은 것은 $\neg$, $\neg$

12. [출제의도] 등비수열을 활용하여 문제
해결하기

$$h(x) = \begin{cases} -\frac{1}{3}x^3 + a - 1 & (x \leq -1) \\ \frac{2}{3}x^3 + ax^2 & (x > -1) \end{cases}$$

$$h'(x) = \begin{cases} -x^2 & (x < -1) \\ 2x^2 + 2ax & (x > -1) \end{cases}$$

조건 (나)에 의하여

함수 $h(x)$ 는 $x=0$ 에서 극대이므로

$$a < 0 \quad \text{㉞}$$

함수 $h(x)$ 는 $x=-1$, $x=-a$ 에서 극소이므로

$$\alpha = -1, \beta = -a$$

$$h(\alpha) = h(-1) = \frac{1}{3} + a - 1 = a - \frac{2}{3}$$

$$h(\beta) = h(-a) = \frac{1}{3}a^3$$

$$h(\alpha) \geq h(\beta), a - \frac{2}{3} \geq \frac{1}{3}a^3$$

$$(a-1)^2(a+2) \leq 0$$

$$a=1 \text{ 또는 } a \leq -2 \quad \text{㉞}$$

$$\text{㉞, ㉞, ㉞에 의하여 } -3 \leq a \leq -2$$

$$b = \frac{1}{2}a - \frac{1}{2} \text{ 이므로}$$

$$a+b = \frac{3}{2}a - \frac{1}{2}$$

$$M = \frac{3}{2} \times (-2) - \frac{1}{2} = -\frac{7}{2}$$

$$m = \frac{3}{2} \times (-3) - \frac{1}{2} = -5$$

$$\text{따라서 } M-m = -\frac{7}{2} - (-5) = \frac{3}{2}$$

16. [출제의도] 수열의 귀납적 정의 이해하기

$$a_1 = 2$$

$$a_2 = \frac{a_1}{1} + 4 = 6$$

$$a_3 = \frac{a_2}{2} + 4 = 7$$

17. [출제의도] 부정적분 계산하기

$$F(x) = \int f(x) dx$$

$$= \int (3x^2 + 4) dx$$

$$= x^3 + 4x + C \quad (\text{단, } C \text{는 적분상수})$$

$$F(0) + F(2) = C + (16 + C) = 14$$

$$C = -1$$

$$F(x) = x^3 + 4x - 1$$

$$\text{따라서 } F(3) = 27 + 12 - 1 = 38$$

18. [출제의도] 로그함수의 성질 이해하기

로그의 진수는 양수이므로

$$x+4 > 0, x-2 > 0$$

$$x > 2 \quad \text{㉞}$$

$$\log_3(x+4) \leq 3 + \log_{\frac{1}{3}}(x-2)$$

$$\log_3(x+4) - \log_{\frac{1}{3}}(x-2) \leq 3$$

$$\log_3(x+4) + \log_3(x-2) \leq 3$$

$$\log_3(x+4)(x-2) \leq \log_3 27$$

로그의 밑이 1보다 크므로

$$(x+4)(x-2) \leq 27$$

$$x^2 + 2x - 35 \leq 0$$

$$(x-5)(x+7) \leq 0$$

$$-7 \leq x \leq 5 \quad \text{㉞}$$

㉞, ㉞에 의하여

$$2 < x \leq 5 \text{ 이므로}$$

정수 x 의 값은 3, 4, 5

따라서 구하는 모든 정수 x 의 값의 합은 12

19. [출제의도] 함수의 극대와 극소를 활용하여 문제 해결하기

$$f'(x) = 3x^2 - 12 = 3(x+2)(x-2)$$

단한구간 $[0, 3]$ 에서 함수 $f(x)$ 의 증가와

감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	0	...	2	...	3
$f'(x)$		-	0	+	
$f(x)$	k	$\searrow$	$k-16$	$\nearrow$	$k-9$

함수 $f(x)$ 는 $x=0$ 에서 최댓값 k 를 갖고,

$x=2$ 에서 극소이면서 최솟값 $k-16$ 을 갖는다.

$$f(0) = k = 40 \text{ 이므로}$$

$$k = 40$$

따라서 단한구간 $[0, 3]$ 에서 함수 $f(x)$ 의

$$\text{최솟값은 } f(2) = k - 16 = 24$$

20. [출제의도] 여러 가지 수열의 합을 활용하여 추론하기

수열 $\{a_n\}$ 이 등차수열이므로

$$\text{자연수 } n \text{에 대하여 } S_n = \frac{n(a_1 + a_n)}{2} \quad \dots \dots \text{㉞}$$

수열 $\{a_n\}$ 의 공차를 d 라 하자.

(i) $n = 2k-1$ (k 는 자연수)일 때,

㉞에 의하여

$$b_{2k-1} = 2 \times \left\{ \frac{(2k-1)(a_1 + a_{2k-1})}{2} - (2k-1)a_{2k-1} \right\}$$

$$= (2k-1)(a_1 + a_{2k-1})$$

$$- 2(2k-1)a_{2k-1}$$

$$= (2k-1) \times (a_1 - a_{2k-1})$$

(ii) $n = 2k$ (k 는 자연수)일 때,

$$b_{2k} = (2k-1)a_{2k}$$

$$b_2 = (2-1)a_2 = a_2 = 2$$

(i), (ii)에 의하여

$$b_{2k-1} + b_{2k} = ((2k-1)) \times (a_1 - a_{2k-1}) + (2k-1)a_{2k}$$

$$= (2k-1) \times \{a_1 + (a_{2k} - a_{2k-1})\}$$

$$= (2k-1) \times (a_1 + d)$$

$$= (2k-1) \times a_2$$

$$= (4k-2) \quad \dots \dots \text{㉞}$$

이다.

㉞에 의하여

$$\begin{aligned} & \sum_{n=1}^{20} b_n \\ &= (b_1 + b_2) + (b_3 + b_4) + \dots + (b_{19} + b_{20}) \\ &= \sum_{k=1}^{10} (b_{2k-1} + b_{2k}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &= \sum_{k=1}^{10} (4k-2) \\ &= 4 \times \frac{10 \times 11}{2} - 2 \times 10 \\ &= \boxed{200} \end{aligned}$$

이다.

$$f(k) = 2k-1, g(k) = 4k-2, p = 200$$

$$\text{따라서 } f(2) + g(3) + p = 3 + 10 + 200 = 213$$

21. [출제의도] 함수의 극한을 활용하여 함수 추론하기

조건 (가)에서 $\lim_{t \rightarrow 0+} g(t) = 6$ 이므로

함수 $y = f(x)$ 의 그래프는 x 축과 서로 다른 세 점에서 만나야 한다.

함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 x 축과 만나는 서로 다른 세 점의 x 좌표는

$$x = a, x = b, x = 4 \text{ 이어야 하므로}$$

$$a < 4 \leq \frac{3}{2}a, b > \frac{3}{2}a \text{ 또는}$$

$$a < 4 \leq \frac{3}{2}a, b < a$$


$$4 = \frac{3}{2}a \text{ 이면 } \lim_{t \rightarrow 0+} g(t) = 5 \text{ 이므로}$$

$$4 < \frac{3}{2}a \text{ 이어야 한다.}$$

$$(I) a < 4 < \frac{3}{2}a, b > \frac{3}{2}a \text{ 인 경우}$$

$$x < a \text{ 또는 } x > \frac{3}{2}a \text{ 에서}$$

함수 $y = |(x-a)(x-b)|$ 의 그래프의 개형은 다음과 같다.



모든 양의 실수 m 에 대하여

$$x < a \text{ 또는 } x > \frac{3}{2}a \text{ 에서}$$

직선 $y = m$ 과

함수 $y = |(x-a)(x-b)|$ 의 그래프가

만나는 서로 다른 점의 개수는

2 이상이므로

$$\lim_{t \rightarrow m+} g(t) \geq 2 \text{ 이다.}$$

그러므로 조건 (나)를 만족시키지 않는다.

$$(II) a < 4 < \frac{3}{2}a, b < a \text{ 인 경우}$$

$$\left| f\left(\frac{3}{2}a\right) \right| = \left| \frac{a}{2} \left(\frac{3}{2}a - 4 \right) \right| = \frac{a}{2} \left(\frac{3}{2}a - 4 \right)$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \frac{3}{2}a+} |f(x)| &= \left| \frac{a}{2} \left(\frac{3}{2}a - b \right) \right| \\ &= \frac{a}{2} \left(\frac{3}{2}a - b \right) \end{aligned}$$

$b < 4$ 이므로

$$\left| f\left(\frac{3}{2}a\right) \right| < \lim_{x \rightarrow \frac{3}{2}a+} |f(x)| \text{ 이다.}$$

$\lim_{x \rightarrow \frac{3}{2}a+} |f(x)| = k_1$ 이라 하면

$$\left| f\left(\frac{b+a}{2}\right) \right| \geq k_1 \text{ 또는}$$

$$\left| f\left(\frac{a+4}{2}\right) \right| \geq k_1 \text{ 일 때}$$

모든 양의 실수 m 에 대하여

$$\lim_{t \rightarrow m+} g(t) \geq 2 \text{ 이므로}$$

조건 (나)를 만족시키지 않는다.

$$\text{그러므로 } \left| f\left(\frac{b+a}{2}\right) \right| < k_1 \text{ 이고,}$$

$$\left| f\left(\frac{a+4}{2}\right) \right| < k_1 \text{ 이다.}$$

$$\lim_{t \rightarrow k_1-} g(t) = 1, \quad \lim_{t \rightarrow k_1+} g(t) = 2 \text{ 이므로}$$

함수 $g(t)$ 는 $t = k_1$ 에서 불연속이다.

조건 (나)에 의하여 $\beta = k_1$ 이다.

(I), (II)에 의하여

$$b < a < 4 < \frac{3}{2}a, \quad \left| f\left(\frac{b+a}{2}\right) \right| < \beta,$$

$$\left| f\left(\frac{a+4}{2}\right) \right| < \beta, \quad \left| f\left(\frac{3}{2}a\right) \right| < \beta$$

함수 $g(t)$ 는 $t = \alpha, t = \beta$ 에서만 불연속이므로
다음과 같이 경우를 나눌 수 있다.

$$(i) \quad \left| f\left(\frac{b+a}{2}\right) \right| \neq \left| f\left(\frac{a+4}{2}\right) \right| \text{인 경우}$$

함수 $g(t)$ 가

$$t = \left| f\left(\frac{b+a}{2}\right) \right|, \quad t = \left| f\left(\frac{a+4}{2}\right) \right|,$$

$t = \beta$ 에서 불연속이므로

조건 (나)를 만족시키지 않는다.

$$(ii) \quad \left| f\left(\frac{a+4}{2}\right) \right| \neq \left| f\left(\frac{3}{2}a\right) \right| \text{인 경우}$$

함수 $g(t)$ 가

$$t = \left| f\left(\frac{a+4}{2}\right) \right|, \quad t = \left| f\left(\frac{3}{2}a\right) \right|,$$

$t = \beta$ 에서 불연속이므로

조건 (나)를 만족시키지 않는다.

$$(iii) \quad \left| f\left(\frac{b+a}{2}\right) \right| \neq \left| f\left(\frac{3}{2}a\right) \right| \text{인 경우}$$

함수 $g(t)$ 가

$$t = \left| f\left(\frac{b+a}{2}\right) \right|, \quad t = \left| f\left(\frac{3}{2}a\right) \right|,$$

$t = \beta$ 에서 불연속이므로

조건 (나)를 만족시키지 않는다.

$$(iv) \quad \left| f\left(\frac{b+a}{2}\right) \right| = \left| f\left(\frac{a+4}{2}\right) \right| = \left| f\left(\frac{3}{2}a\right) \right| \text{인}$$

경우

$$\left| f\left(\frac{3}{2}a\right) \right| = k_2 \text{ 라 하면}$$


$$\lim_{t \rightarrow k_2-} g(t) = 6, \quad \lim_{t \rightarrow k_2+} g(t) = 1 \text{ 이므로}$$

함수 $g(t)$ 는 $t = k_2, t = \beta$ 에서만

불연속이다.

(i) ~ (iv)에 의하여 $\alpha = k_2$ 이다.

함수 $y = |f(x)|$ 의 그래프의 개형은 다음과 같다.



$$\left| f\left(\frac{a+4}{2}\right) \right| = \left| f\left(\frac{3}{2}a\right) \right| \text{ 이므로}$$

$$\frac{(a-4)^2}{4} = \frac{a(3a-8)}{4}$$

$$a^2 - 8a + 16 = 3a^2 - 8a, \quad a^2 = 8$$

$$a > 0 \text{ 이므로 } a = 2\sqrt{2}$$

$$\left| f\left(\frac{b+a}{2}\right) \right| = \left| f\left(\frac{a+4}{2}\right) \right| \text{ 이므로}$$

$$\frac{(a-b)^2}{4} = \frac{(4-a)^2}{4}$$

$$b < a < 4 \text{ 이므로 } a-b = 4-a$$

$$b = 2a-4 = 4\sqrt{2}-4$$

$$f(0) = ab = 2\sqrt{2}(4\sqrt{2}-4) = 16-8\sqrt{2}$$

$$p = 16, \quad q = -8$$

$$\text{따라서 } p^2 + q^2 = 256 + 64 = 320$$

22. [출제의도] 지수함수와 로그함수를 활용하여 문제 해결하기

$$f(x) = 2^{x-m} + n,$$

$$g(x) = \log_2(x-n+1) + m - 7 \text{ 이라 하자.}$$

점 A(a, b)는 제1사분면 위의 점이므로

$$0 < a < b$$

점 B는 점 A를 직선 $y=x$ 에 대하여

대칭이동한 점이므로 B(b, a)이고,

곡선 $y = \log_2(x-n) + m$ 위의 점이다.

곡선 $y = g(x)$ 는 곡선 $y = \log_2(x-n) + m$ 을

x 축의 방향으로 -1 만큼, y 축의 방향으로

-7 만큼 평행이동한 곡선과 일치한다.

점 B를 x 축의 방향으로 -1 만큼,

y 축의 방향으로 -7 만큼 평행이동한 점을

B'(b-1, a-7)이라 하면

점 B'은 곡선 $y = g(x)$ 위의 점이다.

점 B를 중심으로 하고 반지름의 길이가 $5\sqrt{2}$ 인

원을 C라 하자.

$$BB' = 5\sqrt{2} \text{ 이므로}$$

점 B'은 원 C 위의 점이다.

원 C와 곡선 $y = g(x)$ 가 만나는 두 점을

C(x₁, y₁), D(x₂, y₂)라 하면 $x_1 < x_2$ 이고

함수 $g(x)$ 는 $x > n-1$ 인 실수 전체의 집합에서

증가하므로 $y_1 < y_2$

점 B'은 원 C와 곡선 $y = g(x)$ 위의 점이므로

점 B'은 점 C와 일치하거나 점 D와 일치한다.

점 B'이 점 D와 일치하는 경우

$$x_1 < b-1, \quad y_1 < a-7$$

$$b-x_1 > 1, \quad a-y_1 > 7$$

$$BC = \sqrt{(b-x_1)^2 + (a-y_1)^2} > 5\sqrt{2} \text{ 이므로}$$

점 C가 원 C 위의 점이라는 조건에 모순이다.

그러므로 점 B'은 점 C와 일치한다.

조건 (가)에 의하여

직선 AC의 기울기는

$$\frac{a-7-b}{b-1-a} = -3$$

$$a-7-b = -3(b-1-a)$$

$$a-b = -5 \quad \dots \textcircled{1}$$

두 점 A, B를 지나는 직선의 방정식은

$$y = -x + a + b \text{ 이므로}$$

두 점 O, C와 직선 $x+y-a-b=0$ 사이의

거리를 각각 h_1, h_2 라 하면

$$h_1 = \frac{|-a-b|}{\sqrt{2}} = \frac{(a+b)\sqrt{2}}{2}$$

$$h_2 = \frac{|(b-1)+(a-7)-a-b|}{\sqrt{2}}$$

$$= \frac{8}{\sqrt{2}} = 4\sqrt{2}$$

$$\text{삼각형 AOB의 넓이는 } \frac{1}{2} \times \overline{AB} \times h_1 \text{ 이고}$$

$$\text{삼각형 ACB의 넓이는 } \frac{1}{2} \times \overline{AB} \times h_2 \text{ 이므로}$$

삼각형 AOB와 삼각형 ACB의 넓이의 비는

$$\frac{1}{2} \times \overline{AB} \times h_1 : \frac{1}{2} \times \overline{AB} \times h_2 = 27 : 8$$

$$8h_1 = 27h_2$$

$$8 \times \frac{(a+b)\sqrt{2}}{2} = 27 \times 4\sqrt{2}$$

$$a+b = 27 \quad \dots \textcircled{2}$$

①, ②에 의하여 $a = 11, b = 16$

점 A(11, 16)은 곡선 $y = f(x)$ 위의 점이므로

$$2^{11-m} + n = 16$$

위 식을 만족시키는

두 자연수 m, n 의 모든 순서쌍 (m, n) 은

$(8, 8), (9, 12), (10, 14), (11, 15)$ 이다.

따라서 $m+n$ 의 최댓값은 $11+15 = 26$

확률과 통계 정답

23	⑤	24	④	25	①	26	③	27	②
28	⑤	29	41	30	725				

확률과 통계 해설

23. [출제의도] 독립사건의 확률 계산하기

두 사건 A, B 는 서로 독립이므로

$$P(A \cap B) = P(A) \times P(B) = \frac{2}{3} \times \frac{3}{4} = \frac{1}{2}$$

24. [출제의도] 이항정리를 이용하여 항의 계수 이해하기

다항식 $(3x+1)^5$ 의 전개식의 일반항은

$${}_5C_r \times (3x)^{5-r} \times 1^r = {}_5C_r \times 3^{5-r} \times x^{5-r}$$

$(r=0, 1, 2, 3, 4, 5)$

x^2 의 계수는 $r=3$ 일 때

$${}_5C_3 \times 3^2 = 10 \times 9 = 90, a = 90$$

x^3 의 계수는 $r=2$ 일 때

$${}_5C_2 \times 3^3 = 10 \times 27 = 270, b = 270$$

따라서 $a+b=360$

25. [출제의도] 확률의 덧셈정리 이해하기

주머니에서 임의로 2장의 카드를 동시에 꺼내는 경우의 수는 ${}_7C_2 = 21$

주머니에서 꺼낸 2장의 카드에 적힌 수의 차가 2의 배수인 경우는 2, 4, 6으로 3가지이다.

(i) 꺼낸 2장의 카드에 적힌 수의 차가 2인 경우

1과 3, 2와 4, 3과 5, 4와 6, 5와 7로

5가지이므로 구하는 확률은 $\frac{5}{21}$

(ii) 꺼낸 2장의 카드에 적힌 수의 차가 4인 경우

1과 5, 2와 6, 3과 7로 3가지이므로

구하는 확률은 $\frac{3}{21} = \frac{1}{7}$

(iii) 꺼낸 2장의 카드에 적힌 수의 차가 6인 경우

1과 7로 1가지이므로 구하는 확률은 $\frac{1}{21}$

따라서 (i), (ii), (iii)에 의하여 구하는 확률은 $\frac{5}{21} + \frac{1}{7} + \frac{1}{21} = \frac{9}{21} = \frac{3}{7}$

[다른 풀이]

주머니에서 꺼낸 2장의 카드에 적힌 수의 차가 2의 배수이려면 두 수가 모두 짝수이거나 모두 홀수인 경우이다.

(i) 꺼낸 2장의 카드에 적힌 수가 모두 짝수인 경우

숫자 2, 4, 6이 적힌 카드 3장 중

2장을 꺼내는 경우의 수는 ${}_3C_2 = 3$ 이므로

구하는 확률은 $\frac{3}{21} = \frac{1}{7}$

(ii) 꺼낸 2장의 카드에 적힌 수가 모두 홀수인 경우

숫자 1, 3, 5, 7이 적힌 카드 4장 중

2장을 꺼내는 경우의 수는 ${}_4C_2 = 6$ 이므로

구하는 확률은 $\frac{6}{21} = \frac{2}{7}$

따라서 (i), (ii)에 의하여 구하는 확률은

$$\frac{1}{7} + \frac{2}{7} = \frac{3}{7}$$

26. [출제의도] 정규분포의 표준화 이해하기

확률변수 X 가 정규분포 $N(m, \sigma^2)$ 을 따르므로 Z 가 표준정규분포를 따르는 확률변수일 때

$$P(m \leq X \leq 2m) = P\left(0 \leq Z \leq \frac{m}{\sigma}\right) = 0.4772$$

주어진 표준정규분포표를 이용하면

$$P(0 \leq Z \leq 2) = 0.4772 \text{ 이므로}$$

$$\frac{m}{\sigma} = 2, m = 2\sigma$$

$$P(X \geq 2) = P\left(Z \geq \frac{2-m}{\sigma}\right)$$

$$= P\left(Z \geq \frac{2-2\sigma}{\sigma}\right) = 0.8413$$

$$\text{그러므로 } \frac{2-2\sigma}{\sigma} < 0$$

$$P(X \geq 2) = P\left(\frac{2-2\sigma}{\sigma} \leq Z \leq 0\right) + 0.5$$

$$= P\left(0 \leq Z \leq \frac{2\sigma-2}{\sigma}\right) + 0.5$$

$$P\left(0 \leq Z \leq \frac{2\sigma-2}{\sigma}\right) = 0.3413$$

주어진 표준정규분포표를 이용하면

$$P(0 \leq Z \leq 1) = 0.3413 \text{ 이므로}$$

$$\frac{2\sigma-2}{\sigma} = 1 \text{ 에서}$$

$$\sigma = 2, m = 4$$

$$P(0 \leq X \leq 5)$$

$$= P(-2 \leq Z \leq 0.5)$$

$$= P(-2 \leq Z \leq 0) + P(0 \leq Z \leq 0.5)$$

$$= P(0 \leq Z \leq 2) + P(0 \leq Z \leq 0.5)$$

$$= 0.4772 + 0.1915$$

$$= 0.6687$$

27. [출제의도] 원순열 이해하기

원 모양의 탁자에 남학생 4명이 모두 둘러앉는 경우의 수는

$$(4-1)! = 3! = 6$$

자신과 이웃한 두 학생이 모두 남학생인

여학생 1명을 선택하는 경우의 수는

$${}_3C_1 = 3$$

자신과 이웃한 두 학생이 모두 남학생인

여학생이 앉는 경우의 수는

$${}_4C_1 = 4$$

자신과 이웃한 두 학생이 모두 남학생인

여학생의 수가 1이므로 다른 두 여학생은

서로 이웃해야 한다.

서로 이웃한 2명의 여학생이 앉는 경우의 수는

$${}_3C_1 \times 2! = 6$$

따라서 구하는 경우의 수는

$$6 \times 3 \times 4 \times 6 = 432$$

[다른 풀이]

원 모양의 탁자에 7명의 학생이 모두 둘러앉는 경우의 수는

$$(7-1)! = 6! = 720$$

자신과 이웃한 두 학생이 모두 남학생인 여학생의 수가 1이 되도록 하는 사건의 여사건은

3명의 여학생이 모두 이웃하거나 3명의 여학생 중 어느 2명도 서로 이웃하지 않는 사건이다.

(i) 3명의 여학생이 모두 이웃하는 경우

3명의 여학생을 한 명으로 보고

원 모양의 탁자에 남학생 4명을 포함한

5명의 학생이 모두 둘러앉는 경우의 수는

$$3! \times (5-1)! = 3! \times 4! = 144$$

(ii) 3명의 여학생 중 어느 2명도

서로 이웃하지 않는 경우

원 모양의 탁자에 남학생 4명이

모두 둘러앉는 경우의 수는

$$(4-1)! = 3! = 6$$

3명의 여학생이 앉는 경우의 수는

$${}_4C_3 \times 3! = 24$$

구하는 경우의 수는

$$6 \times 24 = 144$$

따라서 (i), (ii)에 의하여 구하는

경우의 수는

$$720 - (144 + 144) = 432$$

28. [출제의도] 중복조합의 수를 활용하여 추론하기

조건 (가)에 의하여 빈 상자 4개에

검은 공 4개를 남김없이 나누어 넣는 경우는

상자 1개에 4개 모두 넣는 경우,

상자 2개에 각각 3개, 1개 넣는 경우,

상자 2개에 2개씩 넣는 경우이다.

(i) 검은 공 4개를 상자 1개에 모두 넣는 경우

검은 공을 넣을 상자 1개를 고르는 경우의 수는

$${}_4C_1 = 4$$

① 검은 공이 들어 있는 상자에 흰 공을 넣지 않고 빈 상자 3개에 흰 공 6개를 남김없이 넣는 경우의 수는

$${}_3H_6 = {}_8C_6 = 28$$

② 검은 공이 들어 있는 상자에 흰 공 1개를 넣는 경우의 수는

$${}_1C_1 = 1$$

남은 흰 공 5개를 빈 상자 3개에 남김없이 넣는 경우의 수는

$${}_3H_5 = {}_7C_5 = 21$$

①, ②에 의하여 조건을 만족시키는 경우의 수는

$$4 \times (28 + 1 \times 21) = 196$$

(ii) 검은 공 4개를 상자 2개에 각각 3개, 1개 넣는 경우

검은 공 3개를 넣을 상자 1개,

검은 공 1개를 넣을 상자 1개를 고르는 경우의 수는

$${}_4C_1 \times {}_3C_1 = 12$$

① 검은 공이 들어 있는 상자 2개에

모두 흰 공을 넣지 않고 빈 상자 2개에

흰 공 6개를 남김없이 넣는 경우의 수는

$${}_2H_6 = {}_7C_6 = 7$$

② 검은 공이 들어 있는 상자 2개 중

상자 1개에만 흰 공 1개를 넣는 경우의 수는

$${}_2C_1 = 2$$

- 남은 흰 공 5 개를 빈 상자 2 개에 남김없이
넣는 경우의 수는
 ${}_2H_5 = {}_6C_5 = 6$
- ③ 검은 공이 들어 있는 상자 2 개에
각각 흰 공을 1 개씩 넣는 경우의 수는
 ${}_2C_2 = 1$
남은 흰 공 4 개를 빈 상자 2 개에 남김없이
넣는 경우의 수는
 ${}_2H_4 = {}_5C_4 = 5$
- ①, ②, ③에 의하여 조건을 만족시키는 경우의
수는
 $12 \times (7 + 2 \times 6 + 1 \times 5) = 288$
- (iii) 검은 공 4 개를 상자 2 개에 2 개씩 넣는
경우
검은 공을 넣을 상자 2 개를 고르는 경우의
수는
 ${}_4C_2 = 6$
- ① 검은 공이 들어 있는 상자 2 개에
모두 흰 공을 넣지 않고 빈 상자 2 개에
흰 공 6 개를 남김없이 넣는 경우의 수는
 ${}_2H_6 = {}_7C_6 = 7$
- ② 검은 공이 들어 있는 상자 2 개 중
상자 1 개에만 흰 공 1 개를 넣는 경우의
수는
 ${}_2C_1 = 2$
남은 흰 공 5 개를 빈 상자 2 개에 남김없이
넣는 경우의 수는
 ${}_2H_5 = {}_6C_5 = 6$
- ③ 검은 공이 들어 있는 상자 2 개에
각각 흰 공을 1 개씩 넣는 경우의 수는
 ${}_2C_2 = 1$
남은 흰 공 4 개를 빈 상자 2 개에 남김없이
넣는 경우의 수는
 ${}_2H_4 = {}_5C_4 = 5$
- ①, ②, ③에 의하여 조건을 만족시키는 경우의
수는
 $6 \times (7 + 2 \times 6 + 1 \times 5) = 144$
- 따라서 (i), (ii), (iii)에 의하여
구하는 경우의 수는
 $196 + 288 + 144 = 628$

29. [출제의도] 이산확률변수의 확률분포를

활용하여 문제 해결하기

확률변수 X 가 가질 수 있는 값은

$0, 2, 4, \dots, 2n$ 이고

$$P(X=0) = \frac{{}_nC_2}{{}_{2n+1}C_2} + \frac{{}_{n+1}C_2}{{}_{2n+1}C_2} = \frac{n}{2n+1}$$

$1 \leq i \leq n$ 인 모든 자연수 i 에 대하여

$$P(X=2i) = \frac{{}_iC_1 \times {}_{n+1}C_1}{{}_{2n+1}C_2} = \frac{n+1}{n(2n+1)}$$

그러므로

$$P(X=2) = P(X=4) = \dots = P(X=2n)$$

$E(X)$

$$\begin{aligned} &= 0 \times P(X=0) + 2 \times P(X=2) \\ &\quad + 4 \times P(X=4) + \dots + 2n \times P(X=2n) \\ &= (2+4+\dots+2n) \times P(X=2) \\ &= 2(1+2+\dots+n) \times \frac{n+1}{n(2n+1)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &= 2 \times \frac{n(n+1)}{2} \times \frac{n+1}{n(2n+1)} = \frac{(n+1)^2}{2n+1} \\ E(X^2) \\ &= 0^2 \times P(X=0) + 2^2 \times P(X=2) \\ &\quad + 4^2 \times P(X=4) + \dots + (2n)^2 \times P(X=2n) \\ &= \{2^2 + 4^2 + \dots + (2n)^2\} \times P(X=2) \\ &= 4(1^2 + 2^2 + \dots + n^2) \times \frac{n+1}{n(2n+1)} \\ &= 4 \times \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} \times \frac{n+1}{n(2n+1)} \\ &= \frac{2}{3}(n+1)^2 \\ E(X^2) &= 14E(X) \text{ 이므로} \\ \frac{2}{3}(n+1)^2 &= 14 \times \frac{(n+1)^2}{2n+1} \text{ 에서} \\ 2n+1 &= 21 \text{ 이므로 } n=10 \end{aligned}$$

$$E(X) = \frac{(n+1)^2}{2n+1} = \frac{121}{21}$$

따라서

$$E\left(7X + \frac{2}{3}\right) = 7E(X) + \frac{2}{3} = 7 \times \frac{121}{21} + \frac{2}{3} = 41$$

30. [출제의도] 조건부 확률을 활용하여

문제 해결하기

시행을 7 번 반복할 때

$a_1 = 0$ 이고 $a_7 = 1$ 인 사건을 X ,

집합 $\{a_m \mid m \text{ 은 } 7 \text{ 이하의 자연수}\}$ 의 원소 중
가장 큰 값이 2 인 사건을 Y 라 하자.

k 가 1 일 확률은 $\frac{1}{6}$,

k 가 2 일 확률은 $\frac{1}{6}$,

k 가 3 이상일 확률은 $\frac{4}{6} = \frac{2}{3}$ 이므로

(i) 7 번 시행 후 $a_1 = 0$ 이고 $a_7 = 1$ 인 경우는

① 1의 눈이 1 번, 3 이상의 눈이 6 번 나오는
경우
구하는 확률은

$$\frac{2}{3} \times \left\{ 6 \times \left(\frac{1}{6}\right)^1 \times \left(\frac{2}{3}\right)^5 \right\} = \left(\frac{2}{3}\right)^6$$

② 1의 눈이 2 번, 2의 눈이 1 번, 3 이상의
눈이 4 번 나오는 경우
구하는 확률은

$$\begin{aligned} &\frac{2}{3} \times \left\{ \frac{6!}{2! \times 3!} \times \left(\frac{1}{6}\right)^2 \times \left(\frac{1}{6}\right)^1 \times \left(\frac{2}{3}\right)^3 \right\} \\ &= 40 \times \left(\frac{1}{3}\right)^6 \end{aligned}$$

③ 1의 눈이 3 번, 2의 눈이 2 번, 3 이상의
눈이 2 번 나오는 경우
구하는 확률은

$$\begin{aligned} &\frac{2}{3} \times \left\{ \frac{6!}{3! \times 2!} \times \left(\frac{1}{6}\right)^3 \times \left(\frac{1}{6}\right)^2 \times \left(\frac{2}{3}\right)^1 \right\} \\ &= 5 \times \left(\frac{1}{2}\right)^1 \times \left(\frac{1}{3}\right)^6 \end{aligned}$$

①, ②, ③에 의하여

$$\begin{aligned} P(X) &= (128 + 80 + 5) \times \left(\frac{1}{2}\right)^1 \times \left(\frac{1}{3}\right)^6 \\ &= 71 \times \left(\frac{1}{2}\right)^1 \times \left(\frac{1}{3}\right)^5 \end{aligned}$$

(ii) 7 번 시행 후 $a_1 = 0$ 이고 $a_7 = 1$ 이므로

집합 $\{a_m \mid m \text{ 은 } 7 \text{ 이하의 자연수}\}$ 의

원소 중 가장 큰 값이 2 인 경우는

① 1의 눈이 1 번, 3 이상의 눈이 6 번 나오는
경우

집합의 원소의 가장 큰 값이 1 이므로
구하는 확률은 0

② 1의 눈이 2 번, 2의 눈이 1 번, 3 이상의
눈이 4 번 나오는 경우

첫 번째 시행에서 3 이상의 눈이 나오고

1의 눈이 2 번 모두 2의 눈보다

먼저 나와야 하므로

구하는 확률은

$$\begin{aligned} &\frac{2}{3} \times \left\{ \frac{6!}{3! \times 3!} \times \left(\frac{1}{6}\right)^2 \times \left(\frac{1}{6}\right)^1 \times \left(\frac{2}{3}\right)^3 \right\} \\ &= 40 \times \left(\frac{1}{3}\right)^7 \end{aligned}$$

③ 1의 눈이 3 번, 2의 눈이 2 번, 3 이상의
눈이 2 번 나오는 경우

첫 번째 시행에서 3 이상의 눈이 나오고

1의 눈과 2의 눈은

1, 1, 2, 1, 2 또는

1, 1, 2, 2, 1 또는

1, 2, 1, 1, 2 또는

2, 1, 1, 1, 2

의 순서로 나와야 하고 각각에 대하여

3 이상의 눈이 1 번 나와야 하므로

구하는 확률은

$$\begin{aligned} &\frac{2}{3} \times \left\{ 4 \times 6 \times \left(\frac{1}{6}\right)^3 \times \left(\frac{1}{6}\right)^2 \times \left(\frac{2}{3}\right)^1 \right\} \\ &= \left(\frac{1}{3}\right)^6 \end{aligned}$$

①, ②, ③에 의하여

$$P(X \cap Y) = 43 \times \left(\frac{1}{3}\right)^7$$

(i), (ii)에 의하여

$$\begin{aligned} P(Y|X) &= \frac{P(X \cap Y)}{P(X)} \\ &= \frac{43 \times \left(\frac{1}{3}\right)^7}{71 \times \left(\frac{1}{2}\right)^1 \times \left(\frac{1}{3}\right)^5} = \frac{86}{639} \end{aligned}$$

$p = 639$, $q = 86$

따라서 $p + q = 725$